

De discussie.

Hierin kwamen enige interessante beschouwingen naar voren. In de eerste plaats bleek, dat sommige aanwezigen bepaalde soorten van de Utrechtse rivierkleibossen ook elders hadden gevonden in overeenkomstige terreinen. (Boletus impolitus, Clitocybe geotropa, Lactarius pallidus). Verder werd door de Heer Tjallingii gevraagd, hoe het stond met het onderzoek van de soorten, die op hout groeien en die volgens Dr. Jahn ook invloed kunnen ondervinden van de bodem, waarop de bomen staan. Voor een deel moest de spreker hierop het antwoord schuldig blijven, want vooral van de Aphyllophorales is nog te weinig onderzocht. Sommige vondsten zouden echter in overeenstemming met een dergelijke invloed kunnen zijn. (Ganoderma resinaceum?)

De heer Barkman vroeg of de kleine soorten wel voldoende waren onderzocht. Hij had opgemerkt, dat de dia's meest grote soorten afbeeldden. Hierop luidde het antwoord, dat de karakterestieke soorten meestal behoren tot de geslachten Amanita, Inocybe, Cortinarius, Russula, Lactarius en Boletus. De kleine paddestoelen werden ook wel gedetermineerd, hier deed de spreker ook nogal eens interessante waarnemingen, maar hun verspreiding over het hele land is slecht bekend, zodat moeilijk gezegd kan worden, of ze karakterestiek zijn.

Het voorkomen in de kleibossen zou een mycorrhiza-verschijnsel kunnen zijn: mogelijk is dat in een ander milieu de schimmelcomponenten dezer symbiose door andere worden vervangen. De Heer Barkman vroeg ook nog naar het aantal soorten, dat in de kleibossen is aangetroffen, hierop kon de spreker geen nauwkeurig antwoord geven, maar het ligt vermoedelijk tussen de 300 en 500. In de toekomst hoopt hij hiervan een lijst te kunnen publiceren.

Dr. A.F.M. Reynders

EEN STERK STAALTJE

Op 28 dec. 1964 zond de heer J.F. ten Hove te Scheveningen een toef van een Pleurotus naar het Rijksherbarium, die was gevonden in het Rijkswegenbouwlaboratorium te Delft.

De toef was ongeveer 20 cm hoog en 14 cm breed en bestond uit verschillende sterk vergroeide hoeden op een zeer hardvlezige basis. Hij was gevonden op hardboard dat bij een betonconstructie was gebruikt. Tijdens de groei van de toef werden 2 staal-platen van ongeveer 2 mm dik elk iets meer dan 3 mm door de paddestoel weg gebogen. Een sterk staaltje van "uitingsdrang" !

De paddestoel behoort ongetwijfeld tot de Pleurotus ostreatus (Oesterzwam) - groep, maar is door de ongewone vorm en zeer bleke bruinige kleur niet nader te determineren.

C. Bas.