

kleurig in water. De 4-sporige basidiën vertoonden geen lyophyllum-reactie. Er waren geen cystiden en de hoedhuid bestond uit radiaire hyphen. Als we er nog eens achter komen wat dit is, zal het zeker in *Coolia* vermeld worden.

C. Bas.

BOEKBESPREKING

P. J. C. Vedder.

Moderne Champignonteelt.

Uitg. Tjeenk Willink-Zwolle. 2e druk 1964.

254 pag. met 124 afb. Prijs geb. F. 15.--

De eerste druk van dit boek werd in *Coolia* 8 (3-5), p. 43-44 door ons besproken. Dat reeds in 1964 een nieuwe druk moest verschijnen, bewijst wel, dat het in een behoefte voorziet. De indeling is dezelfde als in de 1e druk, doch de stof is uitvoeriger behandeld en geeft de nieuwste inzichten in de teelt. Een toegevoegd hoofdstuk: bewaring en verwerking, is zeker van belang voor de kwekers. Hoe snel de champignonteelt zich heeft ontwikkeld blijkt wel daaruit, dat van 1960 tot 1963 de productie toenam van 3 tot 6, 2 miljoen kg, het aantal kwekers van 530 tot 750. De teelt is nog vrijwel beperkt tot de provincies Limburg en N. Brabant en het gebied tussen de rivieren. Tot mijn genoegen heb ik gezien, dat de auteur de oude naam *Psalliota* heeft vervangen door *Agaricus*.

Het boek van Vedder is onmisbaar voor iedere champignonkweker en tevens voor diegenen, die zich voor deze teelt interesseren.

P. B. J.

H. Kreisel: Die phytopathogenen Groszpilze Deutschlands. Jena 1961. Gustav Fisher Verlag, 284 pag., 66 zwart-wit foto's, 45 fig. D. M. 33.20.

Met dit boekje kan men de plantenziekten verwekkende Basidiomyceten (uitgezonderd Roesten en Branden) van Midden Europa determineren. In enkele hoofdstukken vooraf wordt aandacht besteed aan de morphologie en een aantal phytopathologische aspecten, zoals parasitair gedrag, vormen van houtrot, gastheer spectrum, bestrijdingsmogelijkheden etc. Het grootste deel van het boekje wordt echter in beslag genomen door de tabellen tot de geslachten en soorten, die natuurlijk grotendeels betrekking hebben op de Polyporaceae sensu lato en de plaatjeszwammen.

Het boekje lijkt me vooral geschikt voor diegenen, die uit hoofde van hun beroep (bosbouwers b.v.) snel iets moeten kunnen opzoeken over hun parasitaire paddestoel.

C. Bas.

H. Jahn: Mitteleuropäische Porlinge (Polyporaceae s.lato) und ihr Vorkommen in Westfalen. Westfälische Pilzbriefe 4, 1963, 143 pag., 66 zwart-wit foto's, 7 fig. D.M. 12.--.
Te bestellen bij Dr. H. Jahn, Alter Sportplatz 466, Heiligenkirchen über Detmold, West Deutschland.

Een overzicht van de Polyporaceae (100 soorten) uit het Oostelijk aan ons land grenzende deel van Duitsland; ongetwijfeld zeer bruikbaar voor de Nederlandse mycologen! Het boekje bevat een tabel die rechtstreeks tot de soorten gaat. Onder de soorten vindt men een opsomming van de belangrijkste kenmerken en veel gegevens over verspreiding en oecologie. Mede door de fraaie foto's en de lage prijs een zeer aantrekkelijk boekje.

C. Bas.

G A L L E N O P D E P L A T T E T O N D E R Z W A M

In het Handbuch für Pilzfreunde, Band I, wordt op pag. 233 bij Ganoderma applanatum vermeld, dat op deze zwam gallen kunnen voorkomen. Begin augustus 1964 vond ik in de omgeving van Wageningen zulke gallen en misschien komen ze ook wel op andere plaatsen in ons land voor. Van deze tonderzwam met gallen is een kleurenfoto gemaakt, een dia is in mijn bezit.

De gal wordt veroorzaakt door een vliegje: Agathomyia wankowiczi Schabl., behorende tot de fam. der Chythyidae (Platypezidae).

Zie ook Handbuch für Pilzfreunde II, pag. 328. Een foto, die m.i. niet mooi gelijkend is, staat als plaat 11 naast pag. 25.

K. Bakker.

KORTE MEDEDELINGEN

De redacteur verzoekt dringend adreswijzigingen steeds ook aan hem te willen opgeven.

Het Rijksherbarium is onlangs verhuisd van de Nonnensteeg naar Schelpenkade 6, Leiden.

Een nieuwe ledenlijst is in de maak.

We hopen die tegelijk met het volgend nr. van Coolia aan onze leden te kunnen zenden.