

AANDACHT VOOR LECCINUM

Leccinum is het boleten-geslacht waartoe de gewone berken-boleet, *L. scaber*, behoort. Dit geslacht staat de laatste jaren zeer in de belangstelling, daar is gebleken dat het aantal soorten (of ondersoorten of variëteiten, al naar de persoonlijke opvattingen van de verschillende auteurs) aanmerkelijk groter is dan men vroeger meende. In de komende jaren zal een Europese-Amerikaanse combinatie trachten het geslacht gelijktijdig voor Europa en Noord-Amerika te bewerken. Het is dus belangrijk, dat we ook in Nederland extra aandacht aan deze groep besteden.

Vorige herfst vond ik in de duinen bij Vogelenzang onder berken naast de gewone berkenboleet, een vrij groot aantal van een veel grotere en hardere vorm die zo'n beetje de hoedkleur van *Boletus edulis* had. De wratjes op de harde steel waren eerst bleek maar werden later vanaf de basis naar de top zwart-bruin. Er was een opmerkelijk verschil met de gewone berkenboleet wat betreft de verkleuring van het vlees. Verkleurde het bij de laatste alleen wat blauw-groen in de steelbasis; bij de forse vorm was het vlees eerst wat gelig in de steelbasis om vervolgens in de gehele paddestoel licht rose te worden en later weer te verbleken.

In het herbarium duikend vond ik een collectie uit Oostenrijk met dezelfde eigenschappen. Dr. A. F. M. Reijnders vertoonde mij later nog eens een dia die vermoedelijk dezelfde soort betreft (van de Veluwe meen ik). Nadere inlichtingen en materiaal van deze vorm zijn zeer welkom. Op een ander probleem in *Leccinum* hoop ik in een volgend *Coolia*-nummer terug te komen.

C. Bas

Figuren: a — *Gyromitra infula* forma *friesiana* 1/3 x ;
b — Spore van *G. infula* 670 x ; c — Spore van *G. esculenta* 670 x ; d — *Stropharia aurantiaca* 1 x ; e — Sporen van *S. aurantiaca* 670 x ; f — Chrysocystiden van *S. aurantiaca* 670 x ;
g — Randharen van *S. aurantiaca* 670 x ; h — *Russula urens* z x ; i — Spore van *R. urens* 1390 x ; j — Dermatocystiden en saphyphen van *R. urens* 670 x.