

- Lange, J. E. (1915). Studies in the Agarics of Denmark II, Dansk Bot. Ark. 2 (3): 25-26, pl. 1, fig. b.
——— (1935). Flora Agaricina Danica I: 29-30, pl. 10b.
Moser, M. (1955). Die Röhrlinge, Blätter- und Bauchpilze (Agaricales und Gastromycetales. Basidiomyceten II.
Teil in H. Gams, Kleine Kryptogamenflora IIb: 136.
Smith, H. V. (1954). A revision of the Michigan species of *Lepiota*, *Lloydia* 17 (4): 316.

SUMMARY

In September and October 1965 a rather great number of fruitbodies of the rare *Lepiota cortinarius* Lange, a fungus not previously recorded in the Netherlands, was found in a mixed frondose wood near Baarn. A detailed description is given. Spore measurements agreed with those of specimens collected in Michigan, U.S.A.

Herbarium specimens were deposited at the Rijksherbarium at Leiden.

Baarn, 14-XI-1965.

G.A. de Vries

PADDESTOELEN EN VORST

In mijn tuin stonden in de late herfst van 1965 heel wat paarse ridderzwammen (*Lepista nuda*) en wel speciaal op een plaats waar twee jaar tevoren een restje stalmest was blijven liggen. Na een aantal nachten met lichte tot matige vorst in november zagen ze er wat glazig uit, maar schenen verder in goede conditie. Toen ik een exemplaar te sporen zette was een prachtige sporenfiguur het resultaat !

Twee dagen na het beëindigen van de vrij strenge vorstperiode in januari plukte ik in de Pan van Persijn bij Katwijk enige oesterzwammen (*Pleurotus ostreatus*). Ook deze paddestoelen bleken nog rijkelijk sporen te vormen. Het is echter mogelijk dat deze exemplaren onder de sneeuw hebben gezeten en daardoor beschermd zijn geweest tegen uitdroging.

Toch was ik verrast door deze waarneming.

C. Bas