

Daarna besprak dhr. Bas de paarse russula's met paarse stelen n.l.

Russula xerampelina.

Russula sardonis

Russula queletii

Russula torulosa.

Vervolgens kwamen nog enkele recente vondsten ter sprake.

5. Als sluitstuk werd tenslotte de Japanse kleurenfilm over het kweken van Shiitake en andere eetbare paddestoelen vertoond.

De voorzitter sloot hierna de zeer geslaagde en in prettige sfeer verlopen jaarvergadering 1966.

M. Dijkstal, Secr.

WAT ER TER TAFEL KWAM

Aangespoord door de enthousiaste verhalen van de Eindhovense mycologen uit de KNNV, zijn we afgelopen seizoen ook in Hilversum gestart met een paddestoelen-werkgroep, waarvoor al meteen een grote belangstelling was. Bovendien "beschikt" de afdeling Hilversum over twee vooraanstaande mycologen, tw. de heren J. Daams en Dr. G.A. de Vries, die ons op het moeilijke pad van de Mycologie behulpzaam wilden zijn bij de determinaties. Vanaf ongeveer half september van het vorig jaar werd er elke maandagavond bij een van de leden thuis een werkavond gehouden onder leiding van de heer Daams. Een microscoop was altijd aanwezig, zodat we van het begin af aan de vondsten op een meer wetenschappelijke basis konden bestuderen. Talrijke algemene soorten kwamen geregeld ter tafel. Maar we kregen ook zeldzame en zelfs zeer zeldzame vondsten onder de ogen. Practisch alle paddestoelen kwamen uit het Gooi of uit de omgeving van Utrecht (er hadden zich namenlijk ook een paar Utrechtse KNNV-leden aangemeld voor de werkgroep). Van de meer zeldzame soorten kunnen genoemd worden: *Lepiota Cortinarius*, (zie Coolia 12: 48-52), *Microglossum viride* (omgeving Apeldoorn), *Omphalina abiegna* (omgeving Hulshorst), *Polyporus picipes*, *Rozites caperata* (omgeving Hulshorst), *Pluteus petasatus*, *Psathyrella cotonea* en *Leptoporus floriformus*.

Dank zij de medewerking van het Rijksherbarium te Leiden konden we van sommige soorten, waarmee we geen weg wisten, toch de naam te weten komen. Hieronder vindt U een lijst van de min of meer zeldzame soorten die tussen half september en half december gevonden zijn.

Daldinia concentrica	Cystoderma cinnabarinum
Microglossum viride	Gomphidius roseus
Peziza michelii	Gyroporus (Boletus) cyanescens
" repanda	Lepiota Cortinarius
Pulvinula constellatus	Leucocoprinus (Lepiota) denudata
Sepultaria arenicola	Macrocyttidia cucumis
	Marasmius Bulliardii
	" recubans
Clavaria juncea	Mycena adonis
Pterula multifida	Omphalia abiegna
Typhula erythropus	Pholiota astragalina
	" flammans
	" gummosa
Hydnum ferrugineum	Pholiotina (Conocybe) filaris
Sarcodon imbricatum	Pluteus petasatus
	Psathyrella cotonea
Gloeophyllum sepiarium	Resupinatus applicatus
Ischnoderma resinosum	Rhodophyllum sinuatus
Leptoporus floriformis	(is Entoloma lividus !)
Polyporus biennus	Rozites caperata
" picipes	Stropharia percevalii
Cantharellula umbonate	Tricholoma cingulatum
Clitopilopsis popinalis	" imbricatum
Collybia fusipes	" ustale
Crepidotus Bresadolae (pubescens)	

Vanaf eind augustus zullen de wekelijkse determinatie-avonden weer hervat worden. Gelukkig zijn er ook in Hilversum enkele leden die een microscoop hebben aangeschaft, zodat we gezamenlijk de mycologie wat wetenschappelijker kunnen beoefenen onder het toezien van de heer Daams, die zich weer bereid verklaard heeft de leiding van de werkgroep op zich te willen nemen.

J. Frencken,
J. Geradtsweg 71
Hilversum.

HET GROENSTEELTJE, RHODOPHYLLUS INCANUS (Fr.)

Juist ten Noorden van de Drunense duinen loopt een afwateringskanaal van Den Bosch naar Drongelen. Het is destijds gegraven om deze streek van wateroverlast te bevrijden. Doordat de ondergrond hier vaak leem bevat is met het graven van dit kanaal een aardige planten-