

Peniophora hydnoides Cooke & Mass. op Pinus

Ochroporus ribis forma evonyi (Kalchbr.) Schroet. op
Evonymus

Ganoderma pfeifferi Bres. apud Pat. (z. o. naschrift van verslag van deze exc.)

Poria versipora (Pers.)

Polyporus squamosus (Huds. ex Fr.) Fr.

Polyporus ciliatus forma lepideus (Fr.) Kreisel

Mycena praecox Vel.

Clitocybe (?) *vibecina* (Fr.) Quél.

Pseudohiatula tenacella (Pers. ex Fr.) Métrod op kegels van Pinus

**Pseudohiatula stephanocystus Kühn. & Romagn. ex Hora op kegels
van Pinus**

Rhodophyllus cetratus (Fr. ex Fr.) Qué.

Rhodophyllus aprilis

Galerina calyptrata Orton

Galerina hypnorum (Schrank ex Fr.) Kühn

Hypholoma fasciculare (Huds. ex Fr.) Kummer

Hebeloma soort (aff. *H. mesophaeum*)

Coprinus lagopus (Fr.) Fr.

Lactarius rufus (Scop. ex Fr.) Fr.

NIEUWS VAN HET MYKORRHIZAFRONT

Reeds lang weet men, dat vele boomwortels met bepaalde zwammen in symbiose leven. Moderne onderzoekingen hebben aangetoond, dat het bebossen van percelen, die voordien niet met bomen begroeid waren, zeer moeizaam verliep als men de wortels van de jonge boompjes met chemikaliën ontsmette. Deze desinfektie is vaak nodig om bepaalde bodenwormen te doden. Blijkbaar worden door de chemische stoffen ook de mykorrhiza's beschadigd; zodat de jonge boompjes zich niet goed ontwikkelen. Op voedselarme bodem komt de grootste schade voor. Momenteel worden in Sleeswijk-Holstein de verschillende ontsmettingsmiddelen op hun werking ten opzichte van paddestoelen getest.
