

Voor de 22 personen, die aan één of meer van de excursies deelnamen tijdens dit weekend, was Schouwen een mycologische openbaring.

Zaterdagmorgen al kwamen we niet veel verder dan een paar honderd meter van het hotel. Zeer grote exemplaren van gekraagde aardster en grote parasolzwam, waren de eerste tekenen dat we op een goed moment gekomen waren. In de schamel begroeide terreinen rond de vuurtoren wemelde het van de kleine paddestoeltjes. Een zeer goede vangst was Dermoloma (vroeger Tricholoma) cuneifolium sensu Jossierand, een nieuwe soort voor Nederland! Het kleine, geheel grijs-bruine paddestoeltje valt op door dikke, zeer buikige lamellen. De hoedhuid is celluleus en de sporen zijn amyloid. Onder de verschillende Hygrophorus-soorten was ook H. subradiatus sensu Konrad & Maublanc, verwant aan H. niveus, maar met een + stopverfkleurige, in het centrum wat bruinige, doorschijnend gestreepte hoed. Andere aardige vondsten waren Calocybe (vroeger Tricholoma) carnea (Pers. ex Fr.) Donk, Galerina uncialis (Britz.) Kuhn. en Rhodophyllus undatus var. viarum (Fr.) Romagn. De laatste soort vertoonde een opvallende voorkeur voor de zijanten van kleine konijnen-kuiltjes.

In het begin van de middag werden de weiden en bosjes bij het Biesterveld afgezocht. Hier behoorden Hygrophorus laetus (Pers. ex Fr.) Fr., Psilocybe turficola Favre (zeer ongewone standplaats!), Clitopilus hobsonii (Berk. & Br.) Orton = C. pleurotelloides (op gras en paardenvijgen) en prachtige Phellinus igniarius (L. ex Fr.) Quél. tot de buit.

Later in de middag werden de lage duintjes tussen Duinhoeve en Verklikker bezocht. Opvallend waren hier als kruipwilg-begeleiders Boletus edulis Bull. ex Fr., Lactarius controversus (Pers. ex Fr.) Fr., Russula xerampelina (Schaeff. ex Secr.) Fr., R. persicina Krombholz en Paxillus involutus (Batsch ex Fr.) Fr.

Op konijnenkeutels werd Marasmius anomalus Lasch gevonden. Eén van de opvallende Hygrophorus soorten (klein, kleverig, van oranje-rood naar geel verblekend, maar met lang rood-blijvende steeltop) werd als Hygrophorus reai var. insipidus J. Lange gedetermineerd. Tegen de voet van het hoge duin was Lepiota alba (Bres.) Sacc. zeer talrijk. Hier troffen we ook Geastrum saccatum Fr. aan.

Het hoogtepunt van de zondagmorgenexcursie in het kasteel-bos te Haamstede was wel een klein bosje, waar bij elkaar groeiden: Lepiota cristata (Fr.) Kummer, L. castanea Quél., L. pseudofelina Lange, L. subalba Kühner ex Orton en L. fulvella Rea. Eerder was reeds L. brebissonii (Godey apud Gillet Locquin gevonden. In de kasteel-laan stond Otidea bufonia (Pers.) Boud. in mooie exemplaren.

Zondagmiddag vonden we bij Westerschouwen nog enige typisch duindennenbos-soorten zoals b.v. Mycena clavicularis (Fr.) Gill.

De terreinleiding van de heer N.H. Lijsen uit Burgh heeft zeer veel tot het slagen van de excursies bijgedragen!

C. Bas.

WEEK-END DEVENTER 8/9 OKTOBER 1966

Met een voor ons doen bijzonder groot gezelschap (+ 40 personen) trokken we 's zaterdagmorgens naar de Bannink bij Colmschate. Hoewel de oogst niet uitbundig was, werden toch enige mooie vondsten gedaan. Eén hiervan was zeker een prachtige collectie van de groen-gele Cortinarius pseudosulphureus Henry ex Orton (= C. sulphureus sensu Lange). Verder zijn vermeldenswaard: Hygrophorus eburneus (Bull. ex Fr.) Fr., Tricholoma squarrulosum Bres., Marasmius splachnoides (Fr.) Fr., Cortinarius porphyropus (Alb. & Schw.) ex Fr. en een Lyophyllum-soort uit de zwartverkleurende groep die echter nog niet gedetermineerd kon worden.

Zaterdagmiddag werd het Joppe bezocht. De prachtige Coprinus picaceus (Bull. ex Fr.) S.F. Gray stond weer op de van ouds bekende groeiplaats. Cystoderma cinnabarinum werd op verschillende plaatsen gevonden. Later ging nog een klein groepje naar het Hassink en vond daar o.a. Collybia (ook wel Marasmius) fuscopurpurea (Pers. ex Fr.) Kummer op beukenblad. Een grote troep van een geel-sporige milde Russula, in de tinten van bleek bruin tot violet, onder een eenzame dan op een grasveld, bleek R. laricina Vel. te zijn.

's Zondags werd het Gietelse bos tussen Gietelo en Klarenbeek bezocht. Was het zaterdagdag prachtig weer; de regen was nu spelbreker.

In een zware eikenlaan buiten het eigenlijke bos werd Russula clariana Heim gevonden: een stevige, crème-sporige, scherpe soort, met grijs-violette hoed met groenige tinten, grijswordende steel en een sterke geur. Onder Larix stonden prachtige exemplaren van Boletinus cavipes (Opat.) Kalchbr. en langs een pad door dennenbos grote exemplaren van de gelig witte Inocybe sambucina (Fr.) Quél.

De heer Baas en het echtpaar Piepenbroek waren terrein-leiders en mogen hier nog wel eens extra bedankt worden!

C. Bas