

indentiek met *Gal. sahleri* ! Deze *Gal. sahleri* is zeer goed beschreven door de Zwitserse mycoloog Favre (1948).

Leggen we nu ons oor te luisteren bij de Engelse mycoloog Orton (1960) dan krijgen we te horen, dat hij *Gal. calypotrospora* van Kühner voor een synoniem houdt van *Gal. hypnorum*, de bekende mosgalera.

Maar Smith en Singer kunnen deze opvatting weer niet delen !

Al met al dus een aansporing om deze interessante *Galerina* in de voorzomer van 1968 weer op te zoeken. De mogelijkheid lijkt mij groot, dat we hier met een nog niet beschreven soort te doen hebben, die vroeg verschijnt en afwijkt van de tot heden beschreven soorten met "calyptrate" sporen.

P.B. Jansen.

#### Litteratuur:

Favre, J. (1948). Les associations fongique des Hauts Marais jurassiens.

Kühner, R. (1935). Le Genre *Galera*, Encyclopédie Mycologique VII.

Orton, P.D. (1960). New Check List of British Agarics and Boleti, in Trans. Brit. Myc. Soc. 43:237.

Smith, A.H. and Singer, R. (1964). A monograph on the Genus *Galerina* Earle.

#### Verspreidingskaartje *Amanita*

Naar aanleiding van het verspreidingskaartje van *Amanita phalloides* (Coolia 13: 68. 1967), schrijft de heer G.J. Schoevaars, Velp, het volgende. Groene knolamanieten werden in 1954 tijdens een excursie van de N.J.N. in de omgeving van Tongeren (op de Veluwe) gevonden. De standplaats werd beschreven als een terreininzinking, die overwegend met loofhout was begroeid en waar het vochtig was. Als verder opvallende soort werd "Schotel-op-steeltje" genoemd (*Helvella macropus* of, er vaak mee verward, *Helvella villosa*). Deze gegevens zouden er op kunnen wijzen, dat de grondsoort van deze standplaats wat minder zuur en arm is. Het is echter alleszins de moeite waard, wat verdere gegevens en de Amaniet zelf (!) te verzamelen. Wellicht zouden leden, die het terrein kennen, zich de moeite willen getroosten een kleine inventarisatie te verrichten ?

R.A. Maas Geesteranus.