

het verschijnsel waarschijnlijk wel beter te verklaren. Een aanwijzing in die richting is wellicht het simultaan verschijnen op vrij veel plaatsen van *Volvaria volvacea*, dat dit jaar is gesignaleerd.

J. Daams.

NOG EENS DE RIJSTSTRO VOLVARIA

In deel 13 no. 4 van *Coolia* komt een klein artikeltje voor over de verschijning van *Volvaria* in ons land. Ik kan hier een kleine aanvulling op geven omdat deze soort in de warme zomer van 1947 ook in vrij grote aantallen is aangetroffen en wel op een grote oud-papier hoop bij de cartonage fabriek van de N.V. Philips in Eindhoven. Er lag een ongeveer 5 meter hoge stapel van balen oud papier te wachten op verwerking, onbeschermd zodat in het natte voorjaar de hoop flink vochtig is geworden, waarbij broei is opgetreden. De omstandigheden waren blijkbaar gunstig voor de ontwikkeling van enkele fungi, want in de maand Augustus kregen we eerst een prachtige "bloei" van *Volvaria bombycina*, die zeker 6 weken duurde, waarbij duizenden exemplaren in optimale vorm te voorschijn kwamen. 1) Ons lid Dr. Reijnders heeft er toen vele primordia uitgepeuterd voor zijn onderzoek naar de ontwikkeling van Agaricales.

Naast *Volvaria bombycina* kwam minder talrijk *Volvaria volvacea* voor, waarbij hetzelfde verschijnsel optrad, dat in het artikel in *Coolia* wordt beschreven.

Nesten *Volvaria*, die niet tot volledige ontwikkeling kwamen maar vrij snel overgingen in een papperig ingezakt geval dat moeilijk was te drogen. Alleen in een droge periode (er viel nog wel eens wat regen in deze overigens warme periode). Toen het een week lang wat droger was kwamen er enkele te voorschijn die goed gedroogd konden worden ter verzending naar het Rijks Herbarium. Dr. Maas Geesteranus deelde mij bij deze gelegenheid mee, dat in het Herbarium materiaal aanwezig was uit den Haag, gevonden in de zomer van 1919 en uit Leiden, gevonden in de Hortus in 1939.

J. Daams.

1) Fungus 22 -25-1952. J. Daams "*Volvaria bombycina*".