

Hoed:

Lamellen:

Steel:

Hyaline rand

Breekbaarheid

boven lammelen.

Microscopische kenmerken.

Sporen: Vorm en afmetingen

Basidien: 2- of 4 sporig.
afmetingen.

Cystiden: op snede en/of zijvlakken.
op de steel.
dik- of dunwandig.
met kristallen?
afmetingen.
schets van de vorm.

Hyphen: indien bijzonderheden als
bijzondere grote of vorm,
aanwezigheid van pigment,
b.v. incrustatie bij hoedhuidhyphen.

Dit is een omvangrijke lijst, maar men kan de hoeveelheid schrijfwerk heel sterk verminderen door de kenmerken steeds in een vaste volgorde onder elkaar te zetten wat de overzichtelijkheid ten goede komt. Verder kan men zoals in de tabellen gebruik maken van afkortingen en symbolen.

Den Haag - Vlaskamp 90,

Tj. de Cock Buning.

VOOR DE BOEKENPLANK

R.A. Maas Geesteranus, De Fungi van Nederland. II. Pezizales-deel I. 1967. no. 69 van de Wetenschappelijke Mededelingen van de KNNV. f. 4, --. (Voor leden KNNV en NMV f. 3,40). Te bestellen door storting van het vermelde bedrag op postrekening 13028 van het Bureau van de KNNV te Hoogwoud onder vermelding van de titel.

Bovengenoemde publicatie is een belangrijke aanwinst voor hen, die zich bezig houden of willen houden met de Nederlandse Disco's, al moet men niet verwachten, dat men nu alles kan determineren wat men vindt. Het boekje behandelt een deel van de Pezizales n.l. de Discinaceae, Helvellaceae, Morchellaceae, Pizicaceae en Rhizina-ceae, dwz, dat behalve determineertabellen ook uitgebreide beschrijvingen met goede afbeeldingen van de meeste soorten (met microscopische kenmerken) zijn opgenomen. Voor de Humariaceae, Ascobola-

ceae en Sarcoscyphaceae zijn wel determineertabellen opgenomen, zodat men wel tot de geslachten kan komen en in een aantal gevallen ook tot de soortnamen. Voor de uitgebreide beschrijving van soorten uit deze geslachten zullen we moeten wachten tot de verschijning van deel II.

Een 75 tal soorten wordt uitgebreid beschreven, waarbij ook gegevens over de verspreiding van deze soorten worden vermeld. Daarbij blijkt wel hoe weinig er over deze groep bekend is. De schrijver is zeer conscientieus te werk gegaan door in vrijwel elk geval uit te gaan van vers gevonden materiaal, zodat het geheel een goede basis kan vormen voor een verdere uitbreiding van onze kennis van deze interessante groep, waartoe velen kunnen bijdragen. Het is in bepaalde opzichten veel gemakkelijker geworden dank zij de nieuwe tabel. In Moser b.v. komen 68 soorten van het geslacht *Peziza* voor. In de tabel van Maas Geesteranus worden er 27 beschreven, waarbij duidelijk wordt uiteengezet waarom b.v. *P. varia*, *P. tectoria* en *P. muralis* worden geëlimineerd.

Enige maanden ervaring met de tabellen heeft mij geleerd dat deze gemakkelijk zijn te hanteren. Enkele beginners verbaasden zich over het gemak waarmee zij op geslacht en soort terecht kwamen en dit is wel het beste compliment voor de auteur. We hopen nu maar dat het tweede deel niet te lang op zich zal laten wachten.

J. Daams.

I N O C Y B E M A R G A R I T I S P O R A

Op een avondexcursie van de afd. Eindhoven der KNNV vond ik bij Nuenen (ten NO van Eindhoven) een mooi exemplaar van *Inocybe margaritispota* (Berk.) ss Lange (27 juni 1967).

Het stond op een landweggetje tussen het gras, vlak bij Canada Populieren, op enigszins leemachtige grond. Daar het een weinig voorkomende soort schijnt te zijn, volgt hier een korte beschrijving:

- hoed: convex met stompe umbo, 40 mm doorsnede, dik vlezig.
 Umbo dofbruin, naar de rand lichter, tot ongeveer strogeel, met duidelijke, aangedrukte, bruingele schubjes, aan de rand fijn vezelig. De schubjes staken duidelijk af tegen de lichtere ondergrond.
- Steel: stevig, niet hol, 50 mm lang en 7 dik, de voet is iets verdikt, maar geen gerande knol. Kleur wit, onderaan iets