

Ongetwijfeld van groot belang voor allen die met kultures van fungi werken is het zesde hoofdstuk met goed functionerende determinatie-sleutels tot de geslachten van in kultures sporulerende fungi. Het laatste hoofdstuk is in hoofdzaak een beknopt overzicht van de gebruikelijke methodes voor het kweken van schimmels. In de omvangrijke literatuurlijst is de moderne speciale literatuur tot ongeveer 1964 opgenomen.

Voor studenten en geïnteresseerden amateur-mycologen biedt dit goed verzorgde boek een handig overzicht van de moderne systematische mycologie tegen een alleszins redelijke prijs.

J. van Brummelen.

E. Michael & B. Hennig: Handbuch für Pilzfreunde, deel IV: Blätterpilze-Dunkelblättler, Jena, 1967, Gustav Fischer Verlag, 326 pag., 120 gekleurde platen en 22 tekstfiguren, D.M. 43.--.

Dit vierde deel van de recente uitgave van Michael-Hennig's "Handbuch für Pilzfreunde" geeft gekleurde afbeeldingen en beschrijvingen van 313 bruin-, purper- en zwart-sporige plaatjeszwammen.

In het algemene deel, dat 168 pagina's beslaat en aan het deel met platen en beschrijvingen vooraf gaat, worden de volgende onderwerpen besproken: De geografische verspreiding van paddestoelen. Bosgezelschappen en hun paddestoelen. Paddestoelen op standplaatsen buiten het bos. Sociologie van paddestoelen. Hallucinogene fungi. Biografiën van M. Moser en R. Singer. Besprekingen van de families en geslachten waartoe de afgebeelde soorten behoren, n.l. de Agaricaceae p.p. (Agaricus), Crepidotaceae (Crepidotus, Ripartites, Tubaria), Cortinariaceae (Hebeloma, Inocybe, Alnicola, Cortinarius s.l. etc.), Bolbitiaceae (Conocybe, Bolbitius, Agrocybe etc.), Strophariaceae (Pholiota, Hypholoma, Stropharia, Psilocybe) en Coprinaceae (Coprinus, Panaeolus, Psathyrella etc.).

Evenals in het vorige deel zijn de platen zeer wisselend van kwaliteit. Het zijn vooral de kleine soorten waarvan de afbeeldingen minder geslaagd zijn. Afbeeldingen als die van *Inocybe hirtella* en *I. lacera* zijn uitgesproken slecht. Die van *Tubaria pellucida* en *Alnicola melinoides* zelfs totaal onherkenbaar. Sommige platen hebben ook een sterke kleurzweem. Er zijn er echter ook die voortreffelijk zijn.

Ik heb wat de platen betreft geen bronvermelding kunnen vinden, terwijl er toch verschillende bij zijn die op zijn minst geïnspireerd zijn op platen in andere werken.

Over het geheel genomen bevat het boek voor de amateur zeer veel wetenswaardigheden, vooral ook in het algemene deel. De platen zullen in vele gevallen een goede hulp zijn bij het herkennen van soorten, maar soms op dwaalwegen leiden.

Men kan kennis maken met het boek in de verenigingsbibliotheek.

C. Bas.

Gyrodon lividus (Bull. ex. Fr.) Sacc.

Naar aanleiding van de "Terugblik op de excursies" van Mej. Dijkstal in Coolia 13: 104, delen wij een andere vindplaats mee van *Gyrodon lividus*. Wij vonden deze boleet op 21-8-1960 bij de Appense kolken onder Voorst (Gld.) in een Elzen-eikenbosje. Moser geeft op, dat zij aan Elzen gebonden is. De kleur van de hoed is geel tot bruinachtig. De poriën zijn aflopend in golvende lijnen. De poriënlaag is zeer dun.

Drs. Bas, die onze determinatie bevestigde, deelde ons mede, dat er destijds ong. 5 vindplaatsen in Nederland bekend waren.

J.A.C. Veth en A.N. Koopmans.

Lactarius semisanguifluus Heim & Leclair

In aansluiting op het artikel over *Lact. smisanguifluus* in Coolia 12: 4 kunnen wij U nog een nieuwe vondst mededelen van oktober 1967 aan de Felualaan te Apeldoorn onder beuken en eikenhak-hout, ong. 20 min. gaans van de door Prof. Oort, Dr. Tjallingii en Drs. Bas gecontroleerde vondst ten Zuiden van de Amersfoortseweg te Apeldoorns.

De vondst van de Fetualaan was volgens Drs. Bas "zeer overtuigend materiaal". Het orangerode melksap kleure prachtig wijnrood en behield deze kleur.

J.A.C. Veth en A.N. Koopmans.

Reuzevorm van de nevelzwam

Hoe weinig houvast men heeft aan de maten van paddestoelen in de boeken opgegeven, blijkt weer uit een vondst van een prachtig gegolfd exemplaar van *Clitocybe nebularis* (15 okt. '67, Noordlaarder bos). De diameter was liefst 37 cm. Maximum diameter in de boeken vermeld tot 20 cm.

L.S. Wildervanck.