

Over het geheel genomen bevat het boek voor de amateur zeer veel wetenswaardigheden, vooral ook in het algemene deel. De platen zullen in vele gevallen een goede hulp zijn bij het herkennen van soorten, maar soms op dwaalwegen leiden.

Men kan kennis maken met het boek in de verenigingsbibliotheek.

C. Bas.

Gyrodon lividus (Bull. ex. Fr.) Sacc.

Naar aanleiding van de "Terugblik op de excursies" van Mej. Dijkstal in Coolia 13: 104, delen wij een andere vindplaats mee van *Gyrodon lividus*. Wij vonden deze boleet op 21-8-1960 bij de Appense kolken onder Voorst (Gld.) in een Elzen-eikenbosje. Moser geeft op, dat zij aan Elzen gebonden is. De kleur van de hoed is geel tot bruinachtig. De poriën zijn aflopend in golvende lijnen. De poriënlaag is zeer dun.

Drs. Bas, die onze determinatie bevestigde, deelde ons mede, dat er destijds ong. 5 vindplaatsen in Nederland bekend waren.

J.A.C. Veth en A.N. Koopmans.

Lactarius semisanguifluus Heim & Leclair

In aansluiting op het artikel over *Lact. smisanguifluus* in Coolia 12: 4 kunnen wij U nog een nieuwe vondst mededelen van oktober 1967 aan de Felualaan te Apeldoorn onder beuken en eikenhak-hout, ong. 20 min. gaans van de door Prof. Oort, Dr. Tjallingii en Drs. Bas gecontroleerde vondst ten Zuiden van de Amersfoortseweg te Apeldoorns.

De vondst van de Felualaan was volgens Drs. Bas "zeer overtuigend materiaal". Het orangerode melksap kleure prachtig wijnrood en behield deze kleur.

J.A.C. Veth en A.N. Koopmans.

Reuzevorm van de nevelzwam

Hoe weinig houvast men heeft aan de maten van paddestoelen in de boeken opgegeven, blijkt weer uit een vondst van een prachtig gegolfd exemplaar van *Clitocybe nebularis* (15 okt. '67, Noordlaarder bos). De diameter was liefst 37 cm. Maximum diameter in de boeken vermeld tot 20 cm.

L.S. Wildervanck.