

- Flora Batava 27, (1930) T. 2135
 Kreisel H. 1960. Westf. Pilsbriefe 127-131. Foto
 Lange M. 1950. Friesia 4 (1-2) : 66-71
 Lloyd C.G. 1905. Myc. Not. 19 : 209-210, Pl. 44: 5-8
 Lohwag H. 1933. Beih. Bot. Centr. Bl. 51-1: 269-286, T. 3
 Persoon C.H. 1801. Syn. Meth. Fung.: 145.
 Quélet L. 1873. Champ. Jura et Vosg. Repr. 1964: 366-367
 Smarda F. 1958. Lycoperdaceae in Fl. C.S.R. ser. B-1 : 344-345

LACTARIUS TORMINOSUS EN LACTARIUS PUBESCENS

In verband met een onderzoekje, hoe we de twee bovengenoemde soorten kunnen scheiden, zou ik willen vragen of degenen, die één van deze soorten in het najaar vinden, mij de exemplaren willen toezenden, of nog beter er een exsicaat van willen maken, na eerst een sporenfiguur ervan te hebben gewonnen. Het is n.l. wenselijk over exemplaren van zoveel mogelijk standplaatsen te beschikken. Vooral Lactarius pubescens is welkom. Zoals bekend zijn beide soorten Berkenbegeleiders.

Graag een paar aantekeningen over de kleur erbij.

Dr. A.F.M. Reynders
 Kapelweg 140
 Amersfoort.

Verklaring der tekeningen van pag. 4:

- a. Ramaria fennica: het gestippelde gedeelte is ong. paars gekleurd.
- b. Lycoperdon mammiforme, jong ex.
- c. idem , oud ex. met droog endoperdidium
- d. Sporen van Ramaria fennica
- e. " " Lycoperdon mammiforme en enkele stukjes sterigmata en een stuk draad van het capillitium
- f. Cellen uit het velum van Lycoperdon mammiforme.