

Naar aanleiding van het 20 jarig bestaan van de Antwerpse Mycologische Kring bevat deze aflevering een overzicht van het ontstaan van deze Vereniging en haar belangrijkste activiteiten sinds de oprichting in 1946. Oorspronkelijk was het een locale afdeling van de Société Mycologique de France, sinds enige jaren echter is het een geheel zelfstandige groepering. Het blijkt dat er ook voor haar oprichting al heel wat gebeurde, hoewel meer door individuele initiatieven.

Het artikel over het ontstaan en de groei van de Kring, geschreven door L. Imler, die zelf zo nauw bij haar betrokken is als Voorzitter en eerste deskundige (inzake veldmycologie en systematiek), bevat veel personalia. Zo kunnen we lezen over vele oudere en jongere leden en hun activiteiten; vooral de oudere ontmoeten de Nederlanders nogal eens op congressen en excursies; ik beperk mij hier tot de namen G. Andries (†) en N. Tuymans (†).

Persoonlijk mocht ik vele malen het genoegen hebben om tentoonstellingen of excursies van dit gezelschap bij te wonen. Ik heb steeds kunnen profiteren van de serieuze wijze, waarop hier de studie beoefend wordt en van de schat aan soortenkennis, die in de loop der jaren werd verzameld in terreinen, die vaak zoveel lijken op de onze. De gastvrije en open Vlaamse aard sprak mij daarbij veelal sterk aan.

Naast de meer zakelijke gegevens over de Vereniging bevat dit nummer nog een beschrijving van Coprinus brassicae Peck, met bijzonderheden over de naamgeving van deze soort en een aantal notities naar aanleiding van het werk van R. A. Maas Geesteranus over aardtongen, beide door L. Imler.

Gaarne besluit ik met de wens, dat het contact van de Nederlandse mycologen met onze actieve Zuiderburen in de toekomst nog sterker moge worden.

Dr. A. F. M. Reynders.

C O R R I G E N D A

In het artikel van Dr. A. F. M. Reynders: Vondsten in 1966, II, in Coolia 13 (4): 59, zijn in het artikel over Lepista irina enkele hinderlijke fouten blijven staan. Op pag. 59, 24e regel van boven staat: in tegenstelling tot een donkerder L. panaeola, dat moet zijn: in tegenstelling tot een lichtere L. panaeola. Op regel 11 van onderen staat (of L. rickenii), dat moet zijn: (of L. luscina).