

mede houdt de overeenkomst op. Extrapolatie van de Nederlandse gegevens duidt op een volledig verdwijnen van de judasoor in streken, waar de minimum temperaturen enkele graden lager zijn dan in het N.O. van ons land, maar Lowy toont talrijke voorkomens in het noorden van de Verenigde Staten, waar de wintertemperaturen aanzienlijk lager zijn, en Graham (5) geeft voor de streek ten zuiden van de grote meren zelfs op: "common throughout our area".

Hoewel het natuurlijk gemakkelijk is dan maar aan te nemen, dat we in Amerika met een ander ras te doen hebben, zijn daarvoor toch wel aanwijzingen te vinden. Er zijn b.v. uitgesproken verschillen tussen de opgaven van de sporenmaten. Bourdot en Galzin (6) vermelden 17-23x5-8, Donk (7) geeft 16-21x5-7 op en zelf mat ik (18)-21-24x8-9. Daarentegen geeft Lowy 13-15x5-6 en Graham 12x5 op. Verder deelde Dr. Donk mij mede, dat hij gronden die met dit onderzoek niets te maken hebben, zelfs vermoedt dat hier van twee verschillende soorten moet worden gesproken.

Waarschijnlijk het grootste bezwaar tegen de opgestelde hypothese is het feit, dat we in ons land ook buiten het winterseizoen gezond uitzijende judasoren kunnen waarnemen. De vraag kan gesteld worden waarom de verspreiding van de soort, ook al wordt deze in de winter plaatselijk belemmerd, niet buiten dit seizoen zou kunnen plaats vinden. Verder onderzoek is dus wel zeer gewenst. Het inzenden van nieuwe vondsten (met bewijsmateriaal en nauwkeurige plaatsbepaling) is nog steeds van belang. Eveneens houd ik mij aanbevolen voor mededelingen over waarnemingen, die met het voorgaande in verband staan.

Literatuurverwijzingen:

- (1) Bas, C. (1966). Kartering van Macromyceten in Europa. In *Coolia* 13 (2): 29-30.
- (2) Maas Geesteranus, R. A. (1953). *Index Fungus* 1-20: 72.
- (3) Swanenburg de Veye, G. D. (1935). In *Fungus* 6: 56.
- (4) Lowy, B. (1952). The Genus *Auricularia*. In *Mycologia* 44: 656-92.
- (5) Graham, V. O. (1944). *Mushrooms of the Great Lakes Region*. Chicago Academy of Science XXX: 76. Chicago.
- (6) Bourdot, H. et A. Galzin (1927). *Hyménomycètes de France. Hétérobasidiés-Homobasidiés Gymnocarpes*, Soc. Myc. de France: 16. Paris.
- (7) Donk, M. A. (1931). *Revisie van de Nederl. Heterobasidiomycetae en Homobasidiomycetae-Aphylllophoraceae*, deel I. *Med. Ned. Myc. Ver.* 18-20: 104.

H. F. van der Laan
Laan van Leeuwesteijn 21
Voorburg (Z. H.)

PROMOTIE VAN C. BAS

Onder zeer grote belangstelling promoveerde onze Voorzitter op 21 jan. j.l. te Leiden tot Doctor in de Wiskunde en Natuurwetenschappen op het proefschrift: *Morphology and Subdivision of Amanita and a Monograph of its section Lepidella*.

Een jarenlange, zeer diepgaande studie, vond op deze dag zijn bekroning. Het proefschrift, bijna 300 pag., is verschenen als deel 4 van Volume 5 van *Persoonia*, en zal in een volgend nummer van *Coolia* worden besproken.

Op de gezellige receptie, na afloop van de promotie, kregen de aanwezigen de gelegenheid Dr. Bas geluk te wensen. Ook vele leden van onze Vereniging waren aanwezig. Namens de Vereniging werden Dr. Bas enige cadeaux aangeboden.

P. B. Jansen