

C. solitarius: Leiden, Noordwijk: op dode stengels van fluitekruid (*Anthriscus sylvestris*) en bosstrooisel.

C. tigrinellus: Naardermere, Breda; op riet (*Phragmites*), lisdodde (*Typha*) en zeggen (*Carex spec.*).

C. urticicola (inclusief *C. suburticicola* ?): Terschelling, Naardermere, Leiden: op grassen (o. a. *Glyceria*, *Phragmites*) en lisdodde (*Typha*).

C. species (niet in sleutel): Leiden; op kiemende zaden van groot hoefblad (*Petasites*) in schaal met vochtig filtreerpapier. Sporen $5.5-7 \times 5.5-6 \times 4.5-5.5 \mu$, donker purper-bruin, met kleine maar duidelijke kiempore. Basidiën 4-sporig. Gespen aanwezig. Velum-hyphen op hoed $3-9 \mu$ breed, met verspreide dunne uitsteekseltjes, kleurloos tot iets gelig, zeer dunwandig.

Mocht U aanvullende gegevens hebben over deze groep, publiceert U ze dan in *Coolia* of stuur ze aan mij. Misschien kunnen we dan binnen niet al te lange tijd een herziene tabel van deze groep speciaal voor Nederland publiceren.

C.Bas.

FLORADAG 6 MAART 1971

Een groot aantal leden had koude en sneeuw getrotseerd, om de voordrachten over de familie der Bolbitiaceae aan te horen. Nadat we eerst bij gezellig gepraat en een lekker kopje koffie weer op temperatuur waren gekomen, volgden in de ochttenbijeenkomst de lezingen elkaar in snel tempo op. Onze gast, Dr. Watling uit Edinburgh, deed zich kennen als een geestdriftig mycoloog, niet alleen werkend op een herbarium, maar ook in het veld en in het laboratorium met kweekproeven. De soorten der Bolbitiaceae hebben n.l. de aangename eigenschap, dat ze zich goed laten kweken.

In zijn eerste voordracht gaf Dr. Watling een overzicht van de geslachten in de familie, verduidelijkt door vele fraaie dia's.

Als tweede spreker liet Dr. Bas de nederlandse soorten van het geslacht *Agrocybe* de revue passeren, deze soorten zijn over het algemeen goed bekend. Heel mooi waren de dia's van *Agrocybe aegerita* op knotpopulieren in Zeeuws Vlaanderen.

De tweede voordracht van Dr. Watling handelde over de ontwikkeling van de vruchtlichamen van *Conocybe*, waarbij vooral de soorten der *Pholiotina* groep aandacht kregen.

Nadat na de pauze Dr. Kits van Waveren de europese soorten van het ondergeslacht *Pholiotina* met een ring had besproken, kwam tenslotte Dr. Watling voor de derde maal aan het woord en wel over de europese soorten van *Pholiotina* zonder ring en de amerikaanse met een ring.

Een hartelijk applaus beloonde de sprekers voor hun voordrachten.

Een bijzonder woord van dank voor Dr. van Brummelen, die ervoor had gezorgd, dat de inwendige mens werd verkwikt met koffie, lunch en thee, is hier stellig op zijn plaats.

In één der volgende nummers van *Coolia* hopen wij nog nadere verslagen van de lezingen te kunnen publiceren.

P.B.J.