

Een kaartindex op Coolia

Het Rijksherbarium heeft sinds kort een kaartindex op Coolia en elk volgend nummer van ons tijdschrift zal er van nu af aan meteen in worden verwerkt.

Je kunt het immers niet meer onthouden! Naar schatting omvat de index nu al, tot en met Coolia 15(3), zeker 1200 namen. Waar staat b.v. ook weer, dat Cortinarius trivialis in de duinstreek een kruipwilg-begeleider is? (Coolia 13:51. 1967); hoe zat het ook weer met Lepista irina, was daar geen verwarring over en wie heeft daarover geschreven? (Coolia 13:58. 1967); is Conocybe leucopus al eens in ons land gevonden? (Coolia 8: 11. 1961). Als iemand inlichtingen nodig heeft, weet hij het adres. Er is er één, die geen gebruik van de index zal maken, want die heeft zijn eigen kaart-systeem. Alle hulde! Ook dat staat in Coolia, maar ik zeg niet waar. Ik zie hem al grinniken.

Wat het aantal namen betreft, in de nummers van Coolia staan er wellicht nog een paar honderd meer, die niet zijn opgenomen. Het heeft immers geen zin, soorten als Galerina stagnina en Bovista pusilla te vermelden, waar (nog) niets bijzonders van is verteld en die alleen maar in een determinatietabel figureren. De eerste (Coolia 14: 62. 1969) kun je vinden door te bedenken, dat er een Galerina-tabel bestaat en de tweede (Coolia 15: 76. 1971) door te zoeken naar de Bovista-tabel.

Evenmin zijn opgenomen de soorten, die iemand op een buitenlandse tocht heeft ontmoet. Ik ben echter bereid mijn standpunt te wijzigen en een soort dus wel in de index op te nemen, indien er kenmerken van worden besproken, die voor het begrip van de Nederlandse vondsten van belang kunnen zijn.

Tenslotte is er een (nog groeiend) aanhangsel bij dit kaartsysteem. Dat is een index op de vindplaatsen. Iemand kan het toch in zijn hoofd halen te willen weten wat er aan fungi van b.v. de Sterreschans bij Nieuwersluis bekend is. Laat ik er in dit verband meteen op wijzen, hoe belangrijk excursie-reportages in Coolia kunnen zijn. Wij zouden hierdoor in 't bezit van gegevens over de mycoflora van terreinen komen, die eventueel zouden kunnen bijdragen tot het behoud van een in gevaar rakend gebied. Enig inzicht bij het opstellen van een excursieverslag is natuurlijk wel gewenst, maar bepaalde richtlijnen zijn er nauwelijks te geven.

R. A. Maas Geesteranus

Uit de tijdschriften

Boquiren, D.T. 1971: The genus *Epithele*. - *Mycologia* 63: 937 - 957.

Revisie van een geslacht van resupinate Corticiaceen, dat gekarakteriseerd wordt door o.m. 'hyphal pegs' in het mycelium, fructificaties van onbepaalde uitbreiding en basidien die op korte cellen of direkt aan een subculaire hyphe ontstaan. Het omvat 13 soorten (+ sleutel), waarvan er 6 in Europa bekend zijn.

Lowy, B. 1971: New records of mushroom stones from Guatemala. - *Mycologia* 63: 63: 983 - 993.

De paddestoel-stenen zijn 28 - 35 cm hoge sculptures, voorstellende een paddestoel, soms met mannetjes aan de zijkant, die uit de Maya-tijd dateren. Zij worden met religieuze ceremonies met hallucinogene fungi in verband gebracht. W.G.