

Literatuur:

1. Corner, E.J.H. (1948) -- Studies in the basidium I. The ampoule effect, with a note on nomenclature. -- New Phytologist 47: 22-51.
 2. Josserand, M. (1940) -- Etude sur l'ornementation sporique des Lactaires et de quelques autres espèces à spores amyloïdes. -- Bulletin de la Société mycologique de France 56: 7-31.
 3. Perreau-Bertrand, J. (1967) -- Recherches sur la différenciation et la structure de la paroi sporale chez les Homobasidiomycètes à spores ornées. -- Annales des Sciences naturelles, Botanique, Série 12, 8: 639-746.
 4. Wells, K. (1965) -- Ultrastructural features of developing and mature basidia and basidiospores of *Schizophyllum commune* -- Mycologia 59: 236-261.
-

Nog twee aardige vondsten uit 1971

J. Frencken

Hilversum
Joh. Geradtsweg 71

A. COPRINUS PICACEUS.

Het gebied bij Oud-Valkeveen tussen Naarden en Huizen wordt gevormd door de in zee uitlopende noordelijke punt van de Gooise heuvelrug. Bij Oud-Valkeveen zitten we net op de westelijke grens. Het Gelders district gaat daar over in het Haf-district. Naast de daar gelegen vanouds bekende speeltuin "Valkeveen" ligt een paardenbaan met stallen. Tijdens een ekskursie van onze vereniging in 1970 werd daar in een wat rommelig bosje met elzen en Robinia een mooi eksemplaar van *Coprinus picaceus* (Bull.ex.Fr.) Gray, de Spechtinktzwam gevonden. Helaas heb ik deze ekskursie toen niet kunnen meemaken, zodat ik deze fraaie paddestoel toen niet gezien heb. Op 7 december van dat jaar vond ik er echter twee eksemplaren. Maar het jaar daarop was de oogst overweldigend. Toen ik daar op 24 okt. 1971 weer eens ging kijken, kon ik maar liefst 38 stuks tellen. Er waren er bij van wel bijna 40 cm hoog. Het bosje, waarin ik deze 38 eksemplaren vond, was ongeveer 50 meter lang en een meter of 6 breed. Maar blijkbaar had ik toch nog niet alle eksemplaren gezien. Want de dag daarop is Mevr. van Wijk gaan kijken en die vond er toen maar liefst 50 stuks! Het was werkelijk iets unieks al deze fraaie "sinjeuren" zo bij elkaar te zien staan.

In de literatuur vond ik als groeiplaats van *Coprinus picaceus* meestal opgegeven: onder beuk. Soms alleen: onder loofhout. Hier in Valkeveen was het hoofdzakelijk els. Ik geloof te mogen veronder-

stellen, dat een zo grote "bloei" van de Spechtinktzwam slechts zelden voorkomt.

B. PHYLLOPORUS RHODOXANTHUS.

Een veel zeldzamere vondst in dat jaar werd gedaan tijdens onze ekskursie in Het Loo op 18 september, waarbij zoals vanouds de heer J. Vogel uit Apeldoorn onze leidsman was. Als ik me goed herinner was het zo'n beetje tegen het einde van de ekskursie dat Mevr. J. de Kleuver een paddestoel opraapte, die zij een beetje vreemd vond. Enkelen van ons wisten echter meteen een naam te noemen, t.w. *Phylloporus rhodoxanthus*. We hebben het ding allemaal goed bekeken.

Tjallingii vertelde, dat deze soort een overgang vormt tussen de Boleten en de plaatjeszwammen. Als "veldschrijver" heb ik de naam op mijn lijst van vondsten genoteerd, maar het ding "deed" me eigenlijk verder niets. Bij het uitwerken van de lijst thuis heb ik de gewoonte, de mij onbekende soorten van een ekskursie eens wat verder uit te pluizen. Mijn kaartstelsel verwees me naar een nummer van Fungus (12e jaargang Nr. 1 - 15.10'40). En inderdaad kon ik daarin meer informatie vinden over deze soort. In dit nummer brengt Swanenburg de Veye in een bloemrijke taal verslag uit van enkele ekskursies in de omgeving van Apeldoorn op 21 en 22 september 1940 (ook toen met de heer Vogel als leidsman). En als je zo'n verhaal dan leest, merk je, dat er in die 30 jaar eigenlijk niet veel veranderd is in onze vereniging. Zie hier een fragment van zijn verslag: "De heftige en leerzame, maar steeds in uiterst vriendschappelijke toon gehouden disputen, door verschillende lastige geslachten veroorzaakt, waarbij als steeds het resultaat omgekeerd evenredig met de intensiteit van woord en gebaar bleek te zijn, gaven herhaaldelijk een prettige afleiding en van alle kanten snelden de naar meer kennis dorstenden toe, wanneer men er weer een paar in een luidruchtige discussie gewikkeld zag. Bij het thuisbrengen van enkele twijfelachtige Russulasoorten bewees het "kristal van Huysman" (zie Fungus van maart j.l.) goede diensten, al waren helaas de gevallen legio, waarin het alleen maar aangaf, welke soort het niet was en dat gaf je, als niet-specialist in dat geslacht, toch vaak het gevoel nog niet veel verder te zijn." En wat verderop in dit verslag zegt hij dan nog: "..... en dan als neusje van de zalm de wel buitengewoon toevallig gevonden, uiterst zeldzame *Phylloporus* (= *Paxillus*) *rhodoxanthus*, waarover elders in dit nummer meer." In een apart artikel van bovenvermeld Fungus-nummer vertelt Swanenburg de Veye dan wat meer over deze zeldzame soort, die toen als eerste vondst in Nederland genoteerd werd. Hij en Schweers stonden nog wat te bomen over een pasgevonden boomzwam, toen zijn oog viel op een vrij gehavende paddestoel, die wel wat leek op een oude *Tricholomopsis rutilans*. De plaatjes zijn prachtig goudgeel van tint, vrij dik, wijd uiteen en meer of minder aflopend, terwijl ze meestal aan de basis onderling door plooien zijn verbonden. We hebben nu na dertig jaar waarschijnlijk ongeveer op dezelfde plaats de soort opnieuw gevonden. Bij navraag in het Rijksherbarium bleek echter dat in de laatste jaren deze paddestoel toch al wel een enkele keer

meer gevonden was. Dr. Bas stuurde mij het volgende lijstje:

1. Baarn, 1.8.53. G.A. de Vries. Helling langs spoorlijn, onder eik. Den in de buurt.
 2. Gulpen, 20.9.54. G.A. de Vries. Geen standplaatsgegevens.
 3. Ede, 5.10.58. C. Bas. "Hoekelum". Steile rand langs zandweg door heide met berk, eik en den.
 4. Rheden, 28.8.71. C. Bas. Nat. Park Veluwezoom. Loodrechte kant langs weg in beukenlaan in gemengd bos op zurige leem.
- Zoals U ziet, had hij hem zelf in 1971 al een week of drie eerder bij Rheden gevonden.

Mykologen uit vroeger jaren hadden blijkbaar nog al uiteenlopende inzichten over het bepalen van de systematische plaats van deze "overgangspaddestoel". Fries had hem ondergebracht in *Flammula*. Patouillard vond het meer een *Paxillus*-soort. Gillet hield het op *Clitocybe* en Saccardo voelde meer voor *Gomphidius*. In de literatuur kan men *Phylloporus rhodoxanthus* vinden onder de volgende namen: *Paxillus paradoxus*, *Paxillus thamii*, *Paxillus rhodoxanthus*, *Flammula paradoxa* en *Phylloporus pelletieri*. De huidige naam luidt: *Phylloporus rhodoxanthus* (Schw.1822) Bres. 1900. Onder deze naam staat hij ook in Moser en in de "Flore". De soort werd in 1805 voor het eerst beschreven door Schweinitz. In Michael-Hennig "Handbuch für Pilzfreunde" deel II staat op bladzijde 235 een mooie afbeelding met een uitvoerige beschrijving. Ook Swanenburg de Veye geeft in bovengenoemde Fungusaflevering uit 1940 een beschrijving van deze soort.

Een interessante vondst op Texel

M.E. Noordeloos

p/a Rijksherbarium
Leiden.

In augustus-september van het jaar 1971 werd door de heren de Jonge en den Hartog op dode bladscheden van *Juncus maritimus* langs de Moksloot op Texel een klein *Marasmius*-achtig paddestoeltje aangetroffen. Het materiaal was echter in een zodanig slechte toestand dat een uitgebreide bestudering van de anatomische kenmerken erg moeilijk was. Op aanraden van de heer Bas ben ik op 7 september 1972 uitgebreid gaan zoeken op dezelfde plaats en tot mijn voldoening kon ik een tiental exemplaren van deze soort mee naar huis nemen.

Het bleek al spoedig dat we hier te doen hebben met een vertegenwoordiger van het geslacht *Marasmiellus* Murr. (*Marasmius* sectie *Ramealini* bij Kühner & Romagn.). Hieronder volgt een beschrijving