

Helvella leucopus en Gyromitra esculenta in Zeeuws Vlaanderen

J. Rammeloo
Laboratorium voor Plantensystematiek

B-9000 Gent
België

Tijdens een vluchtig voorjaarsbezoek aan de Plaat van Bakkersdam (5-6-1973) trof ik, zoals vorige jaren, een vrij behoorlijk aantal vruchtlichamen aan van een *Helvella*, die na determinatie met de werkjes van Maas Geesteranus (2) en Dissing (1) zonder twijfel *H. leucopus* Pers. is. De meeste vruchtlichamen waren vrij oud, dikwijls reeds sterk uitgedroogd. Op dezelfde plaats was een vrij massaal voorkomen van *Gyromitra esculenta* (Pers. ex Krombh.) Fr. waar te nemen. Alhoewel midden in de polder gelegen, heeft de Plaat van Bakkersdam een vegetatie, die vergelijkbaar is met die van een vochtige duinvallei (met o.a. *Ophioglossum vulgatum*, *Dactylorhiza incarnata*, *D. praetermissa*, *Orchis militaris*, *Salix repens* en op de drogere gedeelten o.a. *Botrychium lunaria*). De vruchtlichamen van beide soorten stonden gekoncentreerd aan de rand van een weinig betreden paadje in een korte, droge grasvegetatie, die rijk was aan éénjarigen, op een zandige bodem. In het gebied zijn Canadese populieren aangeplant.

Gezien de pedologische en fytosociologische gelijkenis van dit terrein met de duinen is het voorkomen van *Helvella leucopus* midden in deze polder niet als abnormaal te beschouwen.

Daar *H. leucopus* volgens Maas Geesteranus (2) slechts van enkele vindplaatsen in de duinen bekend is en *Gyromitra esculenta* niet voor Zeeuws-Vlaanderen genoemd wordt, leek het mij interessant, beide vondsten te signaleren.

Literatuur:

1. Dissing, H. (1966). The genus *Helvella* in Europe. - Dansk botanisk Arkiv 25 (1).
2. Maas Geesteranus, R.A. (1967). Pezizales I. - Wetenschappelijke Mededelingen der K.N.N.V. 69.

=====