

namen, een alfabetische lijst van kleurennamen met uitleg en verwijzingen naar de betreffende vakjes op de platen, een schematisch overzicht van de kleurenplaten met daaronder de namen beschikbaar voor de kleuren op die platen en tabellen met Munsell-notaties voor alle kleurvakjes. Uiteraard is de tekst in het Engels.

Mocht U het boekje snel willen hebben, dan kunt U het bestellen bij Krypto (F. Flück-Wirth, CH-9053 Teufen, Zwitserland) en kost het U 30.- Zw.Fr. U kunt het ook iemand voor £ 2.75 uit Engeland laten meebrengen.

Bij het aanleggen van een paddestoelen-herbarium zijn kleur-notities met behulp van een kode eigenlijk onmisbaar. Maar laat men vooral nooit vergeten de kleur ook in eigen woorden te beschrijven; men weet tenslotte nooit zeker, of degene die later de beschrijving raadpleegt de betreffende kleuren-kode direkt bij de hand zal hebben.

=====

BOEKBESPREKING

=====

J. Eriksson & L. Ryvarden - The Corticiaceae of North Europe Vol. 2, p. 60-261 + 24 p. foto's. Fungiflora, Oslo. N.Kr. 54, eksklusief porto.

Na het standaardwerk van Bourdot en Galzin heeft de taksonomische ontwikkeling van de Corticiaceae weer verscheidene decennia stilgestaan, om in de vijftiger en zestiger jaren weer stormachtig op gang te komen. Met Donk, Eriksson, Oberwinkler en Parmasto zijn de belangrijkste hervormers wel genoemd. Van hen heeft alleen Parmasto zich aan een overzicht van de hele familie gewaagd. Het enige determinatiewerk is dat van Christiansen, dat Denemarken bestrijkt. Met recht kan dus gezegd worden, dat de bovenstaande flora in een behoefte voorziet.

De Corticiaceae zijn in een ruime zin opgevat; genera als *Amylostereum*, *Ceratobasidium*, *Cerinomyces* en *Clavulicium* zijn ook opgenomen. De geslachten worden ingeleid met een beschrijving,

diskussie en een sleutel tot de soorten. Aan iedere soort zijn minstens twee pagina's gewijd, waarvan één aan tekeningen, die evenals de foto's (ook scanning) van goede kwaliteit zijn. Het areaal is beperkt tot Fennoscandia; daar niet voorkomende soorten zijn slechts incidenteel besproken. Het eerst verschenen deel van dit werk (vol. 1 met o.a. de sleutels tot de geslachten zal als laatste verschijnen), dat de geslachten in alfabetische volgorde behandelt, omvat *Aleurodiscus* t/m *Confertobasidium*.

Enkele belangwekkende taksonomische opmerkingen kunnen worden gemaakt. Het *Athelia epiphylla*-kompleks is op de traditionele brede basis behandeld; de indeling van Jülich, die het opgesplitst heeft, is niet geaksepteerd. Het geslacht *Byssocorticium*, tot nu toe voorbehouden aan blauw-groene soorten, is breder opgevat door het opnemen van *Athelia coprophila* en een nieuwe, eveneens gele soort. *Byssomerulius* is beperkt tot het vroegere subgenus *Byssomerulius* met als enige soort *B. corium*, die in het vruchtlichaam geen gespen heeft, maar deze in cultuur wel, zij het zelden, kan hebben. Boidin heeft zelfs kransgespen waargenomen, wat de veronderstelde verwantschap met *Phanerochaete* nog waarschijnlijker maakt. Parmasto's subgenus *Ceraceomerulius*, met soorten die als verwant met *Ceraceomyces* worden beschouwd, is tot geslacht verheven.

Hoewel verschillende in Nederland voorkomende soorten niet in dit werk zijn opgenomen, is het toch het meest volledige dat bestaat. Het zal dan ook blijken onmisbaar te zijn voor iedereen, die zich met deze groep bezig houdt, terwijl de prijs (± f 28,-- inkl. porto) buitengewoon laag is. Het kan besteld worden bij: Fungiflora, Blindernveien 46c, Oslo-3, Noorwegen.

J. Stalpers

=====