

### Aanvulling:

Dank zij de vriendelijke medewerking van E. Arnolds kon ik het herbarium-materiaal van het Biologisch Station te Wijster nagaan. Daarin komt van 10 vindplaatsen voor:

Rhodocybe arenicola (Fr. 1873) Lange & Sivertsen 1966, misschien synoniem met Rh. caelata (Fr. 1838) Maire 1926. Alle vondsten zijn gedaan in droge heide en jeneverbesstruwelen. Ook Rh. popinalis en Rh. parilis blijken in Drente op meer plaatsen voor te komen.

## HEYDERIA ABIETIS IN ROBBENOORD

G.C.N. van Zanen

de Breekstraat 36  
Nieuwendam 1121

Het Robbenoordbos in de Wieringermeerpolder is een kunstmatig aangelegd bos in de eerste drooggelegde IJsselmeerpolder. Het heeft nu langzamerhand een voldoende gevorderde leeftijd gekregen om een behoorlijke mykoflora te herbergen. Het is bovendien voldoende wisselend van samenstelling om in deze mykoflora ook een aardige verscheidenheid aan soorten te laten verwachten.

Dat konden wij konstateren op een gewestelijke paddestoelen-ekskursie van de KNNV op 28 oktober 1973, die een redelijke rijkdom aan soorten opleverde, waarbij van iedere soort vele exemplaren aanwezig waren. Een ekskursiedeelner bracht een handjevol sparrenaalden aan, waarop wat klein spul groeide. Na op het eerste gezicht de vondst uitgemaakt te hebben voor wat verschrompelde *Mycena*'tjes of *Marasmius*'jes moest deze uitspraak bij nader onderzoek met de loop onmiddellijk weer ingetrokken worden: de onderkant van de hoed was dicht en er waren geen lamellen te ontdekken. Toen gingen de gedachten uit naar het mijtertje (*Mitrula paludosa*), maar dit is een voorjaarspaddestoel, die op in het water liggende rottende naalden of bladeren groeit, terwijl onze exemplaren onder een spar op een plekje zanderige grond gevonden werden. Het beste was dus enig materiaal mee te nemen voor onderzoek.

Een coupe vertoonde al gauw de asci met scheef in de rij

liggende sporen,  $12,0-14,3 \times 2,8-3,5 \mu$ , die opvallend smal en bovendien aan één kant wat afgeplat of zelfs ingebogen waren. Met de Geoglossaceae-tabel (W.M. 52) komt men dan vrij gemakkelijk uit op *Heyderia abietis* (Fr.) Weinm. op grond van de sporematen, maar vooral ook van de verschillen in steel en hoed. De makroskopische kenmerken waren als volgt: "hoed" min of meer spits, kegelvormig, gerimpeld, geelbruin tot lederkleurig, scherp afgescheiden van de steel en 0,5-1 cm groot; steel donkerbruin, waterig, ongeveer glad,  $\pm 1$  mm dik en 1-2 cm lang.

Veertien dagen later zijn mijn vrouw en ik nog eens teruggegaan naar het Robbenoordbos en hebben van dezelfde vindplaats, waar nog vrij veel exemplaren stonden, wat materiaal verzameld en opgestuurd naar Leiden. De bevestiging kwam reeds na enkele dagen, met de waarschuwing erbij, dat *Heyderia abietis* de auteursnaam (Fr.) Weinm. krijgt en niet (Fr.) Link zoals in W.M. 52 vermeld, aangezien Weinman de namen juist iets eerder (1826) combineerde dan Link (1833).

#### Literatuur:

1. Maas Geesteranus, R.A. (1964). De fungi van Nederland -  
1. Geoglossaceae aardtongen. - Wetensch. meded. K.N.N.V. nr. 52.

## "PUSTULARIA" PATAVINA, EEN NIEUWE SOORT VOOR NEDERLAND

J. Geesink

Javastraat 17  
Den Helder

Schelpenpaadjes veroorzaken een verstoring van het milieu, en juist de overgang - gradiënt - naar de bestaande toestand geeft vele plantesoorten gelegenheid zich daar te ontwikkelen. De kalkrijkdom en het voorkomen van mossen op die gradiënt geeft ook paddestoelen, die hieraan zijn gebonden, een goede bestaanskans.

Bij Appelscha, zure, arme bosgrond, zijn nogal wat schelpenfietspaden aangelegd, die ik dan ook regelmatig naar meestal