

Literatuur:

1. Buller, A.H.R. (1920). Three new British Coprini.- Transactions of the British Mycological Society 6: 363-365.
2. Geesink, J. (1973). Nog een primeur voor Nederland. - Coolia 16: 73-75.
3. Kühner, R. & Romagnesi, H. (1953). Flore analytique des Champignons supérieurs. Paris.
4. Romagnesi, H. (1941). Etudes de quelques Coprins. - Revue de Mycologie 6: 108-127.
5. Romagnesi, H. (1945). Etudes de quelques Coprins (2e Série). - Revue de Mycologie 10: 73-89.

HERICIAM ERINACEUS TE ST. KRUIS-BRUGGE.

J. Rammeloo

Ledeganckstraat, 35
Gent, België

Naar aanleiding van het artikel van G. Van den Ende in het vorige nummer van Coolia, waarin om vindplaatsen van *H. erinaceus* gevraagd wordt, willen we graag het jarenlange voorkomen van deze soort te St. Kruis (Brugge) een 11-tal km. van de Nederlands-Belgische grens signaleren.

De zeer forse vruchtlichamen komen voor op een oude beuk, die deel uitmaakt van de kleine beukenlaan, die naar de omheiningegracht van de kasteelboerderij van St. Kruis loopt. Op een hoogte van 5 à 6 m vertoont de boom een lange spleetvormige opening waarin een vrij groot aantal (5 à 6) grote "hoeden" (25 cm hoog, 14 cm dik, 23 cm breed) boven elkaar voorkomen. De vruchtlichamen werden het eerst in het najaar 1969 waargenomen en komen sedertdien telkenjare terug.

Volgens de bewoners van de kasteelboerderij zaten ze reeds verschillende jaren "geplaagd" met de vruchtlichamen, die ze elk jaar verwijderden.

=====