

BOEKBESPREKING

Roy Watling: Identification of the larger fungi. Hulton Group Keys. Hulton Educational Publications Ltd., Raans Road, Amersham, Bucks. HP6 6 JJ, G.B., 1973. 281 pp., 81 + 4 platen met pentekeningen, paperback.

Weer een paddestoelenboekje met tekeningen en beschrijvingen van talrijke soorten, maar wel enigszins alternatief. De auteur is velen van ons door zijn lezingen in Leiden goed bekend en wekt hoge verwachtingen. Hij richt zich voornamelijk tot de met paddestoelen beginnende student en probeert hem meteen efficiënt aan het werk te zetten: verzamelen, beschrijven, tekenen, coupes maken en mikroskoperen, waarvan de technieken uitvoerig worden beschreven. Voor het verzamelen wordt vanaf het begin naar oekologische bijzonderheden verwezen; alleen een duidelijke aanbeveling voor het bewaren van droog materiaal ontbreekt. Anders dan de titel zou doen vermoeden, is dit geen determineerboek, maar een allereerste inleiding tot het bestuderen van paddestoelen.

Het hoofddeel is onderverdeeld in Agarics (inkl. boleten), bracket fungi and relatives (Aphyllorphales), Trilzwammen (Heterobasidiomyceten), Gasteromyceten, Ascomyceten en paddestoelen van bijzondere biotopen (mest, brandplekken etc.); voor de 5 grote groepen zijn er vrij eenvoudige sleutels tot de meest belangrijke geslachten. Meestal is er per geslacht één soort vrij uitvoerig beschreven, soms met opmerkingen over verwante soorten. Ik heb 116 beschreven soorten geteld, die op 81 platen door eenvoudige en vrij schematische pentekeningen geïllustreerd zijn, vooral met mikroskopische structuren. De gekozen soorten zijn zo algemeen, dat iedere student ze alle in één seizoen tegen kan komen. Het gekozen spektrum komt vrij goed met de nederlandse flora overeen.

De soorten zijn oekologisch gerangschikt, d.w.z. eerst mycorrhiza-vormers, dan parasieten, saprophyten op hout, saprophyten op de grond, paddestoelen op weiden etc. Zodoende komen er soms soorten van één geslacht (bv. *Coprinus*) op verschillende plaatsen in het boek voor. Aan het einde volgen soortenlijsten voor bepaalde biotopen, een verklarende lijst van technische termen, suggesties voor het bestuderen van heksenkringen en de ontwikkeling van vruchtlichamen, 1½ blz. literatuurcitaten en een indeks.

Er zijn wat drukfouten te vermelden, bv. in de eerste sleutel schept de 2e verwijzing 24 i.p.v. 25 al verwarring, en de boleten verschijnen bij no. 52 zonder enige voorafgaande aankondi-

ging. In de uitgangen van de gebruikte paddestoelnamen staan enkele fouten. De verklaringen van de tekeningen zijn soms onduidelijk; de sporen van pl. 28 zijn bv. nergens verklaard.

Toch geeft het boekje voor minder dan een tientje waar voor Uw geld en is het een nuttige inleiding voor ambitieuze studenten, die het in één jaar best kunnen doorwerken in een fase, waar Moser nog erg moeilijk is en vele andere boeken niet toegankelijk zijn. Een grote verspreiding en het verschijnen van verbeterde drukken zijn daarom wenselijk.

W. Gams

=====

VERENIGINGSNIEUWS

WERKWEEK AMBLETEUSE 1973

Evenals het jaar tevoren werd in 1973 een werkweek georganiseerd in het "Laboratoire de Biologie Marine" te Ambleteuse, aan de Kanaalkust ten noorden van Boulogne-sur-Mer en wel van 13 tot 19 oktober. De organisatie berustte weer bij de familie Tjallingii. Er waren 13 deelnemers, waaronder onze Belgische leden de Heer en Mevrouw Morren. De akkomodatie in laboratorium en logeergebouw was nog gerieflijker dan de eerste keer: er was zelfs een ijskast.

Na de tot eind september bijzonder droge zomer had het ook daar sinds twee weken geregend, wat een grote opbloei van de paddestoelenflora had veroorzaakt: in totaal werden 282 soorten genoteerd, tegen slechts 140 in 1972! Dit was echter niet te danken aan de kalkgraslanden en de duingebieden, die nog armer aan fungi waren dan het jaar te voren en evenmin aan de moerassen bij Tardinghen, die door een forse waterstandsverlaging vrijwel paddestoelloos waren. Het succes was bijna geheel te danken aan de bossen, waarvan het Forêt de Boulogne en het Forêt de Desvres met name te noemen zijn, die een rijke oogst opleverden. Afwijkend, waarschijnlijk samenhangend met bodemverschillen, gedroeg zich het Forêt d'Hardelot, deze keer uitgesproken armer dan de vorige keer, zij het met *Psathyrella cotonea* (aan de voet van een levende Els) en *Lactarius hygginus* (bij loofhout!). Uit de andere bossen en bosjes vallen te vermelden: *Agaricus mediofuscus*, *Amanita inaurata*, *Bolbitius aleuriatus*, *Clitocybe geotropa* (in enorme heksenkringen), *Cortinarius multififormis* (in het veld eerst voor *Leucocortinarius bulbiger* aangezien), *Hygrophorus leuco-*