

-smaak heeft (hoewel niet vermeld).

Klap op de vuurpijl: Mocht men het calyptraat zijn van de sporen over het hoofd zien, dan belandt men met de sleutels van Smith en Singer via de sectie *Mycenopsis*, dan de subsectie *Mycenopsidae* en tenslotte de stirps *Mycenopsis* toch direkt op *G. fallax*, die veiligheidshalve ook hier in de sleutels is opgenomen! Dit is dan een steun voor de opvatting onze drie vondsten met de naam *G. fallax* te bestempelen. Aan de lezer laten wij de keuze.

Literatuur:


1. Barkman, J.J. (1969). Het geslacht *Galerina* in Nederland. - *Coolia* 14: 49-86.
2. Kühner, R. (1935). Le genre *Galera*. - *Encyclopédie Mycologique* 7, Paris.
3. Smith, A.H. & Singer, R. (1955). New species of *Galerina*. - *Mycologia* 47: 557-596.
4. Smith, A.H. & Singer, R. (1964). A monograph on the genus *Galerina* Earle. - New York.

OVER CORTINARIUS ACUTUS

K. Booij

Middenraai 69
Nieuweroord (Dr.)

Het is eigenlijk een hachelijke onderneming om een naam te zetten boven een artikeltje over een *Telamonia*. Genoemde paddestoelen zijn lastige knapen om op naam te brengen; het lukt me lang niet altijd. In dit geval gaat het over een soort met cheilocystieden, die het mogelijk maken, de soort goed te herkennen. Ik meen, dat het hier gaat om *Cortinarius acutus* (Pers. ex Fr.) Fr. De paddestoeltjes stonden tussen mos onder koniferen. Ze komen voor in september-oktober. *C. acutus* is volgens Moser een kleine soort met een hoeddiameter van 1-1,5 cm. Als het goed is, moet deze in vochtige toestand nog okergeel zijn. Onze soort is in jonge toestand rossig en dan doorzichtig gestreept. Zij wordt



Cortinarius acutus; a. vruchtlichamen; b. sporen;
c. cheilocystiden.

echter spoedig okergeel en verliest dan de randstreping. De hoed heeft een zeer spitse umbo en dat klopt weer volgens Moser. De Flore geeft een variatie in hoedkleur van rossig tot honinggeel. Er worden twee variëteiten beschreven: één uit moerasgebied en één uit naaldbos. De lamel-kleur is geel lichtbruin met een wit-vlokkige snede. De steel is okerkleurig, wat overeenkomt met de literatuurgegevens. Moser schrijft niets over de vorm der cystiden: "mit Cheilozystiden". De Flore noemt voor de moerasvorm zeer lange cystiden met uitsteeksels. De naaldboutvorm moet knotsvormige cystiden hebben. "Mijn" soort heeft variabele cystiden: van smal of breed lancetvormig tot min of meer flesvormig, waarbij de basale breedte en de lengte van de "halzen" sterk varieert. Sommige zijn bijna capitaat. Knotsvormige zijn er m.i. niet bij, om van zeer lange maar niet te spreken. De sporenmaten komen ongeveer overeen met die uit de literatuur: 7,5-10 x 5-6 μm. De afbeelding in Moser (no. 146) klopt vrij goed met deze vondst. *Cortinarius acutus* wordt één keer in Coolia genoemd in een exkursieverslag (Middachten, 1966). De Flore noemt deze *Cortinarius* niet algemeen.