

GYMNOPIIUS FLAVUS EN FUNALIA GALLICA

W. Hanegraaff

Grote kerk 22
Vlijmen

1. *Gymnopilus flavus* (Bres.) Sing. Op 29 september vorig jaar ontdekte ik in het gras bij ons in de voortuin één oranje-bruine paddestoel. Ik had toen nog vrijwel geen goede boeken (Mijn beste boek was de kleine 'Lange') en daardoor dacht ik dat het wel *Gymnopilus penetrans* zou zijn, en nam hem onder die naam in mijn herbarium op.

Toen ik echter deze winter de twijfelachtige soorten in mijn herbarium nog eens nader aan het determineren was met de inmiddels aanwezige 'Moser' (1967), bedacht ik, dat het nooit *Gymnopilus penetrans* kon zijn, want er waren nergens naaldbomen in de buurt. En inderdaad: met Moser kwam ik direkt op *Gymnopilus flavus*. Het klopte precies; de sporen waren goed aan de maat, en er waren cheilocystiden. Dr. Bas bevestigde mijn determinatie, en deelde me mee, dat dit de tweede vondst voor het Rijksherbarium was en daarom is de helft van het doorgesneden exemplaar daar gebleven; de andere helft is in mijn bezit. De heer Huysman schreef me, twee kollekties te hebben, en ook de heer Jansen zond me wat materiaal toe, waarvoor hartelijk dank. Drs. Benjaminsen zei me op de mycologendag, dat ook hij zich herinnerde wel wat materiaal te hebben.

2. *Funalia gallica* (Fr.). Bond. & Sing. Op 22 februari j.l. vond ik op een stapel boomstammen in de 'Guldenberg' (Druñense duinen) een aantal exemplaren van een polypoor, die ik met Jahn (1963) bepaalde op *Trametes extenuata* Dur. & Mont. Jahn schrijft in de beschrijving, dat hij als één der voornaamste verschilpunten tussen *Trametes extenuata* en de er zeer op gelijkende *T. trogii* de intensieve zwartverkleuring van het trama van *T. extenuata* met KOH heeft gevonden. Het trama van mijn exemplaar kleurde inderdaad diepzwart, en ook de overige kenmerken klopten goed. Dr. Bas schreef me, dat de tegenwoordige naam *Funalia gallica* is, en dat er alleen materiaal van vóór 1930 in het Rijksherbarium aanwezig was (Putten, Bloemendaal, Nijmegen, Amersfoort). De heer van Zanen is de enige van de door mij ondervraagde herbariumbezitters die misschien wat materiaal bezit. De heer Geesink was zo vriendelijk mij een aflevering van 'Westfälische Pilzbriefe' te sturen, waarin de soort uitvoerig wordt besproken (Jahn,




Fig. A. *Gymnopilus flavus*. a. Vruchtlichamen, b. habitus, c. sporen ($4,5-5,6 \times 3,6-3,9 \mu\text{m}$), d. cheilocystide.

Fig. B. *Funalia gallica*. a. habitus, b. vruchtlichaam bovenaanzicht.

1968); in de literatuuropgave van dit artikel wordt nog een aantal publikaties over deze houtzwam genoemd, die ik niet bezit, maar sommigen van u waarschijnlijk wel (Birkfield, 1965; Domański, 1968; Kreisel, 1962). Deze vondst deed ik in de winter, en daaruit blijkt wel dat het aanbeveling verdient, om zelfs dan eens naar houtzwammen te kijken.

Literatuur:

1. Birkfield, A., (1965). Neue Funde der Braunen Borstenträmte. - *Trametes extenuata* Dur. & Mont. Mykol. Mitt. Blatt 9: 78-81.
2. Domański, S., (1968). Grzyby zasiedlające drewno w Puszczy Białowieskiej. V. *Trametella extenuata* (Dur. & Mont.) Domań. Acta Soc. Bot. Polon. 37: 125-144.
3. Jahn, H., (1963). Mitteleuropäische Porlinge (Polyporaceae s. lato) und ihr Vorkommen in Westfalen. Westfälische Pilzbriefe 4: 1-143, blz. 76.

4. Jahn, H., (1968). Beobachtungen an *Trametes extenuata* Dur. & Mont. im Leipziger Raume. Von W. Fritzsche u. K. Herschel (samenvatting van H. Jahn). Westfälische Pilzbriefe VII. Band. Heft 3/4 blz. 48.
5. Kreisel, H., (1962). *Trametes extenuata* und *Trametes trogii* in Deutschland, Ber. Bayer. Bot. Ges. 35: 55-56.
6. Moser, M., (1967). Die Röhrlinge und Blätterpilze. 3. Aufl. Fischer, Stuttgart: 342.

TWEE DERMOCYBE-SOORTEN

K. Booy

Middenraai 69
Nieuweroord (Dr.)

Medio oktober 1972 vond ik in "de Sleutel" te Stuifzand ongeveer 3 km N.O. van Hoogeveen (Dr.) een mooie oranjeachtige *Dermocybe*. De soort groeide in een ondiepe kuil van enkele meters doorsnede aan de rand van een gemengd bos. In de directe omgeving stond voornamelijk *Salix* en *Betula*, terwijl de grond vochtig en enigszins zuur geweest moet zijn getuige de aanwezigheid van *Juncus*. De paddestoeltjes in kwestie groeiden op en bij een half vergane boomstam (naalddhout). Hoewel het mij duidelijk is, dat *Cortinari*-soorten moeilijk te determineren zijn, heb ik ze toch verzameld om ze thuis te onderzoeken. Als men het niet probeert, leert men ze nooit kennen.

De hoeden waren 1,5-3 cm in doorsnede, gewelfd met het typische *Dermocybe*-bultje, fraai oranje-bruin van kleur en zeer fijn radiaal vezelig, bijna glanzend. De iets buikige lamellen waren vrij breed en bochtig aangehecht, aanvankelijk oranjegeel, later oranjebruin wordend. De oranje steel was met donkerder vezeltjes bezet, hol, aan de basis soms iets verdikt, 4-7 x 0,3-0,5 cm. De sporemaat bedroeg 7-10 x 5-5,5 μ m.

Met Moser determinerend was de paddestoel gemakkelijk op naam te brengen, t.w. *Dermocybe uliginosa* Berk. In dit werk wordt als maat van de sporen 8-9 x 5-5,5 μ m opgegeven en in de vroegere uitgave van 1955 8,8-10 x 5 μ m. Geen belangrijke verschillen dus.