

Van de overige vondsten volgt hier een bloemlezing:

<i>Daldinia concentrica</i>	<i>Exidia truncata</i>
<i>Helvella queletii</i>	<i>Melanoleuca cf. strictipes</i>
<i>Ischnoderma benzoinum</i>	<i>Peziza michelii</i>
<i>Psathyrella pygmaea</i>	<i>Ramaria ochraceo-virens</i>
<i>Ripartitis tricholoma</i>	<i>Strobilurus esculentus</i>
<i>Tremella encephala</i>	

Afkortingen van herbaria:

R.H.	Rijksherbarium, Leiden	P.B.J.	P.B. Jansen
E.A.	E. Arnolds	H.L.	H.L. van der Laan
H.A.A.	H.A. van der Aa	A.E.J.	A.E. Jansen
F.B.	F. Benjaminsen	M.N.	M. Noordeloos
F.v.d.B.	F.A. van den Bergh	A.R.	A.F.M. Reijnders
J.D.	J. Daams	R.S.	R. Swart
W.H.	W. Hanegraaff	Schr.	J. Schreurs
H.G.	H. Geesink	F.T.	F. Tjallingii
T.K.	T. Kuiper	D.T.	D. Tjallingii
J.F.	J. Frencken	Vr.	G.A. de Vries
J.W.	J. Wisman	G.Z.	G. van Zanen

PHYLLOPORUS RHODOXANTHUS IN NEDERLAND

P.B. Jansen

Paul Windhausenweg 26
4818 TB Breda

Deze boleetachtige paddestoel met zijn sterk gevorkte lamellen is in het veld gemakkelijk te herkennen, iets wat van veel andere soorten niet gezegd kan worden. Op 31 aug. 1977 vond ik in het Schaelsberger bos in Zuidlimburg, eigendom van Natuurmonumenten, een fraai exemplaar van deze soort met nog een paar geheel beschimmelde ernaast. In de jaargangen van Fungus en Coolia vindt men zijn naam niet dikwijls vermeld. Om enig inzicht te krijgen over de verspreiding in Nederland heb ik nagegaan, wat er in Fungus en Coolia van te vinden is en welke vondsten er in het Rijksherbarium worden bewaard, in onderstaand staatje het resultaat.

<u>Datum</u>	<u>vindplaats</u>	<u>waarnemer</u>	<u>literatuur</u>	<u>herbarium</u>
1940 (22-I)	Het Loo (G)	Eks.Myc.Ver.	Fungus 12:12	
1944 (VII)	Mook (L)	Schweers	Fungus 16:31 en " 20:49	Rijksherb.
1953 (I-VIII)	Baarn (L)	G.A.de Vries	Coolia 1:26	Rijksherb.
1954 (20-IX)	Gulpen (L)	G.A.de Vries		Rijksherb.
1958 (5-X)	Ede (G)	C. Bas	Coolia 5:46	Rijksherb.
1971 (8-IX)	Het Loo (G)	Mevr.de Kleu- ver-Schreuters		Rijksherb.
1977 (31-VIII)	Valkenburg (L)	P.B. Jansen		Herb.P.B.J.

Stellig zullen er in ons land nog wel meer vondsten bekend zijn. Zo deelde Dr. Huysman mij mede, dat hij *Phylloporus* kende uit de Achterhoek.

De meeste vondsten zijn gedaan in loofbossen of aan de rand daarvan. In Europa komt maar één soort voor, in andere delen van de wereld is het geslacht beter vertegenwoordigd. Singer vermeldt ongeveer 25 soorten.

Over de systematische plaats van *Phylloporus* heerst nogal wat onenigheid bij de mycologische Goden. Slechts enkele meningen:

Singer (1975) plaatst het geslacht met *Xerocomus* in de subfamilie *Xerocomoideae*. Watling (1970) echter verbant het naar de familie der *Paxillaceae*. Heinemann schrijft in de *Flore Iconographique des Champignons du Congo*: laten wij eraan denken, dat die twee geslachten (*Phylloporus* en *Xerocomus*) buitengewoon dicht bij elkaar staan en dat handhaven ervan alleen maar om praktische redenen te rechtvaardigen is. Kühner & Romagnesi in de "Flore" over *Phylloporus*: "coupure sans valeur", de enige Franse soort is niet te scheiden van *Boletus subtomentosus*.

En ten slotte zegt Michael-Hennig: Eetbaar en lekker, maar te beschermen!

Literatuur:

- Singer, R. (1975). The Agaricales in modern taxonomy. 3rd ed. Cramer, Vaduz.
- Watling, R. (1970). British fungus flora, Agarics and Boleti. I. Boletaceae: Gomphidiaceae: Paxillaceae. 124 pp. Edinburgh, Her Majesty's Stationery office.