

R. kunzei groeit op diverse plaatsen in grasgazons, doch is niet altijd te onderscheiden van *Ramariopsis tenuiramosa* Corner. Beide soorten gaan a.h.w. in elkaar over (zie de W.M.). Gezamenlijk ken ik ze nu van 6 groeiplaatsen met totaal ruim 40 exemplaren. De hier besproken *Ramariopsis* betreft exemplaren van één groeiplaats met vruchtlichamen die duidelijk tot *R. kunzei* behoren. In 1976 was *R. kunzei* present van begin okt. t/m 12 december, één exemplaar werd toen 10 weken oud. In 1977 vond ik ze vanaf 25 sept. t/m 7 nov.

MYCOLOGISCHE NOTITIES

OVER AURICULARIOPSIS AMPLA

Tijdens ons najaarsweekend op Walcheren vonden we op 30 oktober 1977 vlak bij het strand in de duinen van Domburg op populierentakken een groot aantal *Stereum*-achtige paddestoeltjes. Aan de bovenzijde waren ze wit viltig, aan de onderzijde (het hymenium dus) enigszins vleeskleurig en duidelijk geaderd, waardoor ze deden denken aan kleine Judasoortjes. Geen van de deelnemers kon aan deze ongeveer 2 cm grote paddestoeltjes een naam geven. En daar het ter plaatse door de harde wind nogal fris was, werd de vondst maar vlug ingepakt. Thuis kon ik met behulp van Jahn's werk "Stereoides Pilze in Europa" snel achter de identiteit komen: *Cytidia flocculenta* (Fr.) Höhn. et Litsch. Onder deze naam kwam de vondst dan ook in het ekskursieverslag.

Een tijdje geleden echter kwam ik bij een poging iets meer aan de weet te komen over *Cyphella*'s in het uitgebreide artikel van Donk (1959) "Notes on Cyphellaceae I" de naam van het geslacht *Auriculariopsis* Maire tegen. In dit geslacht wordt één soort vermeld: *Auriculariopsis ampla* (Lév.) Maire = *Cytidia flocculenta* (Fr.) Höhn. et Litsch.

Zoals bij zovele paddestoelen ook hier de nodige verwarring. Fries gebruikte in 1828 de naam *Thelephora flocculenta* en in 1838 de naam *Corticium flocculentum*. Höhnelt en Litschauer maakten in 1907 de nieuwe combinatie *Cytidia flocculenta*. Gelukkig was er in Zweden nog materiaal aanwezig met het handschrift van Fries, wat bij mikroskopisch onderzoek *Corticium evolvens* bleek te zijn (Donk, 1959).

In 1848 werd onze paddestoel beschreven door L  veille onder de naam van *Cyphella ampla*. In 1902 cre  erde Maire het nieuwe geslacht *Auriculariopsis*, dat hij van het genus *Cyphella* afscheidde wegens het gelatineuze weefsel; in dit geslacht vinden we tot nu toe    n soort: *Auriculariopsis ampla* (L  v.) Maire. Een zeer fraaie afbeelding ervan kon ik bekijken in het Rijksherbarium in de Flore Batava, deel 14, plaat 1074, onder de naam Groote *Cyphella*. Er is een bijschrift bij van F.W. van Eeden: "de afgebeelde exemplaren zijn in Maart 1869 gevonden door mijn zoon J.A. van Eeden op doode en afgevalen takken van Canadapopels, dicht bij de Overveensche duinen."

Vermeldde Donk in 1931 reeds diverse vindplaatsen voor ons land, in 1959 schrijft hij: In Nederland vrij algemeen in de duinen van Oostvoorne tot N. van Haarlem. Verder bekend van vrijwel geheel Europa, gematigd N. Amerika en soms Nieuw Zeeland (wellicht daar ingevoerd). Meest groeiend op diverse soorten populieren, maar ook bekend van *Rubus* en    n vondst op *Pyrus malus* (appel) en *Salix babylonica* (treurwilg).

Ten slotte nog iets over de Nederlandse naam: noemde van Eeden onze paddestoel "Groote *Cyphella*", dan denkt men daarbij gauw aan hangende, zeer tere zwammetjes, zoals *Cyphella*'s aan brandnetels of grassen. Zou de naam Klein Judasoortje niet toepasselijker zijn?

P.B. Jansen.

NOGMAALS: PHYLLOPORUS RHODOXANTHUS

In een vorig nummer van *Coolia* (deel 21 Nr. 3, 1978) geeft P.B. Jansen een overzicht van de vindplaatsen van deze zeldzame paddestoel. Jammer genoeg is dit overzichtje niet compleet. Toen ik Jansen er over sprak, vertelde hij mij, dat hij slechts de indeksen van *Fungus* en *Coolia* had nagetrokken. Hij heeft toen mijn verhaal van een latere datum dan de indeks van *Coolia* (*Coolia* 16 (3): 54, 1973) verschenen is over het hoofd gezien. Welnu: daarin heb ik wat uitvoeriger over *Phylloporus rhodoxanthus* geschreven. Jansen heeft wel van Dr. Bas nog een opgave gekregen van de vondsten die in het Rijksherbarium liggen. En dat was ondermeer het geval met de vondst uit 't Loo door Mevr. Janny de Kleuver van 18 sept. 1971. In dat jaar is de soort twee keer gevonden, namelijk ook nog op 28 aug. bij Rheden door Bas. Dan ontbreekt aan het lijstje van Jansen ook nog een vondst van Dr.E. Kits van Waveren, die op mijn artikel reageerde in het aansluitende nummer van *Coolia*, t.w. deel 16, Nr. 4 onder de titel "Van de Florakommissie". Daarin doet hij nog melding van een vondst door hem gedaan in de omgeving van Gulpen op 16 sept. 1970, waar-