

## MYCOLOGISCHE NOTITIES

OVER CORTINARIUS SUBSERTIPES

In de periode van sept. - okt. 1975 heb ik enige kollekties kunnen verzamelen van *Cortinarius subsertipes* Romagn. in een  $\pm$  10 jaar oude aanplant van de Douglasspar in de boswachterij Gees (Drente). Ik vond ze langs een paadje tussen mos en naaldenstrooisel. Het is een ietwat vochtig bosje op schrale zandgrond. Er komen op deze plek meer *Telamonia*-soorten voor, die stuk voor stuk hun problemen geven bij de determinatie. Van de meeste is het me gelukt, maar regelmatig verzamelen en geduldig determineren is een eerste vereiste.

Hoed 2-3 cm in diameter, aanvankelijk breed klokvormig, later meer uitgespreid met een vrij spitse papil, kastanjebruin met donkerbruin centrum, soms met een violette weerschijn, velumresten vooral in jonge toestand zichtbaar als witte spinnewebachtige vlokjes op de hoedrand. Lamellen met tandje aan de steel gehecht, iets buikig, jong lichtbruin, spoedig door rijpe sporen roodbruin. Steel 40-60 x 4 mm, aan de basis met ovaal knolletje, 6 mm dik, bruinachtig met witte velumzōnes (door de vrij lange steel maakt de paddestoel een slanke indruk). Sporen 10-12 x 6-7 $\mu$ m, stomp ellipsoïd, tamelijk fijn-wrattig, vrij licht onder het mikroskoop (het is mogelijk dat de sporen later iets donkerder worden).

*C. subsertipes* is volgens de "Flore" een vrij algemene soort. In Coolia werd ze echter nooit eerder vermeld. De beschrijving in Michael-Hennig, Handbuch für Pilzfreunde IV: 300, (pl. 124) voldoet goed, maar de plaat lijkt niet zo best. De beschrijving in Bertaux, A., Les Cortinaires: 88, Paris, 1966 voldoet goed. De soort lijkt goed gekenmerkt door het knolletje aan de voet van de steel en de bleke sporen. Verwisseling met andere soorten blijkt mogelijk. Zo suggereert Michael-Hennig dat vroeger *C. subsertipes* veel met *C. erythrinus* Fr. werd verward. Volgens Moser is verwisseling met *C. flexipes* Fr. en *C. casimiri* (Vel.) Huysm. mogelijk. Volgens laatstgenoemde auteur zou *C. subsertipes* identiek kunnen zijn met de eerder beschreven *C. unimodus* Britz.

K. Booy