

## BOEKBESPREKING

RYVARDEN, L. - *The Polyporaceae of North Europe*. Fungiflora, Oslo.

Vol. 1, Albatrellus - Incrustoporia, 1976, p. 1-214. N.Kr. 75,-

Vol. 2, Inonotus - Tyromyces, 1978, p. 217-507. N.Kr. 125,-

Beide delen zijn uitgegeven op de bekende Fungiflora manier, d.w.z. gebrocheerd, rijk geïllustreerd, tekst zonder strakke achterlijn. De illustraties bestaan uit tekeningen van vnl. mikrostrukturen (vaak nogal sterk vergroot) en foto's, zowel makrofoto's als scanning elektronenmikroskopische foto's. Deze foto's zijn van wisselende kwaliteit en vooral in deel 2 vaak veel te hard afgedrukt (in deel 1 zijn ze nogal eens te zacht, wat echter minder storend is). Wat betreft de SEM foto's moet opgemerkt worden, dat het materiaal waarschijnlijk (er is geen verantwoording van de methode) ongefikseerd en luchtgedroogd is, wat het totaalbeeld niet ten goede komt.

Deel 1 begint met een goed geïllustreerde inleiding, waarin o.a. makro- en mikrostrukturen worden besproken. De verwijzing naar de illustraties is hier niet altijd even gelukkig. Zo wordt voor een afbeelding van skelethyfen verwezen naar fig. 47 (*Cerrena unicolor*), waarop voornamelijk dikwandige generatieve hyfen zijn afgebeeld. Voor bindhyfen wordt verwezen naar dezelfde fig., alsmede naar fig. 61, waarop naast een dikwandige onvertakte hyfe alleen dunwandige hyfen staan. Ook de omschrijving van het begrip "skelethyfe" zal niet de instemming van de meeste taksonomen hebben; hieronder worden ook dikwandige hyfen met een in KOH oplosbare wand begrepen (b.v. *Poria lindbladii*).

De hierop volgende sleutel tot de geslachten is praktisch en zal in de meeste gevallen zonder problemen naar het doel leiden. Hierna volgen in alfabetische volgorde beschrijvingen van de genera en de soorten. Over Ryvardens afwijkende taksonomische opvattingen is al uitvoerig ingegaan door Jahn (Westf. Pilzbr. 11: 27-28, 1976) en ik zal dat hier niet herhalen. Met uitzondering van het geslacht *Antrodia* vallen de konsekwenties van deze opvattingen nogal mee.

In deel 2 valt op dat, hoewel Ryvarden's genuskonsept meestal ruim is, hij toch *Osmoporus* handhaaft naast *Gloeophyllum*. De geslachten *Trametes* en *Tyromyces* daarentegen worden in zeer ruime zin behandeld. *Trametes* bevat naast de soorten van *Coriolus* (nu vrij algemeen geaksepteerd) ook de soort *T. trogii*, voorheen vaak geplaatst in *Funalia* of *Coriolopsis*. *Tyromyces* bevat naast de soorten uit de genera *Oligoporus* en *Strangulidium* ook *Poria aneirina* en *P. mappa*, alsmede *Tyromyces wynnei*. Deze laatste soort is recent door David in het geslacht *Heteroporus* (= *Abortiporus*) geplaatst, waar ze m.i. ook behoort.

Tenslotte blijkt Ryvarden in zijn auteurs citering bij de soortnamen konsekvent alle auteurs vóór 1821 te negeren. Zo spreekt hij over *Polyporus brumalis* Fr. i.p.v. (Pers.) ex Fr. en over *Grifola frondosa* (Fr.) S.F. Gray i.p.v. (Dicks. ex Fr.) S.F. Gray.—J.A. Stalpers.

## UIT DE TIJDSCHRIFTEN

### ZEITSCHRIFT FUER MYKOLOGIE

Sinds einde 1977 heet de "Deutsche Gesellschaft für Pilzkunde" heel deftig "Deutsche Gesellschaft für Mykologie" en het tijdschrift "Zeitschrift für Mykologie". Vanaf band 44 is deze naamsverandering ingegaan. De indeling is overzichtelijker geworden, aan het begin van elk artikel staat een korte samenvatting in het engels en in het Duits.