

Ik hoop met deze tip anderen narigheid te besparen.

W.W. van der Poel, *Van Kijfhoeklaan 126, 2597 TG Den Haag.*

Over enkele vondsten uit het elzenbroek Siberië bij Beilen.

Elzenbroekbos is zeldzaam in ons hoge noorden. In het door ons bedoelde geval is het dan ook maar een klein deel van het bos dat voor de benaming 'elzenbroek' in aanmerking komt. Dat gedeelte ligt vlak bij een kanaaltje dat vanwege zijn hoge waterstand na langdurige regen nogal eens buiten zijn oevers treedt.

Een jaar of tien geleden was de waterstand daar nog hoger, maar het moderne waterbeheer deed het bosje veel van zijn oorspronkelijke charme verliezen. Deze charme bestond uit Basterdwederik (*Epilobium*), Engelwortel (*Angelica sylvestris*) en Bosveldkers (*Cardamine flexuosa*). Nu begint, naar mij dunk, de braam de overhand te krijgen. De oever langs het kanaaltje ligt hier en daar nogal laag zodat vooral bij natte zomers zich daar een interessante paddestoelenflora kan ontwikkelen. De zandige en zure bodem is daar verrijkt met wat keileem dat bij het graven van het kanaal in de bovengrond terechtgekomen is. Een indikator daarvoor is *Cortinarius delibutus* Fr. die daar ieder jaar gevonden kan worden. Dan eens hier, dan eens daar, maar steeds in kleine groepjes. Deze soort is te verwarren met *C. illibatus* Fr., maar de laatste heeft nimmer blauwe lamellen en meer olijfgleurige tinten in de hoed en wordt naar de laatste gegevens van Moser alleen in naaldbossen gevonden. Bovendien hebben ze bij vochtig weer een wat minder slijmerige steel.

Natuurlijk kwam ik ook weer een aantal vertegenwoordigers van het subgenus *Telamonia* tegen. Hoewel het hier gaat om een eikenhakhoutbosje met een strook elzen langs het water, staan er ook hier en daar berken. Bij die boomsoort vond ik een grote groep donkerbruine *Telamonia*'s. In massa geoogst hadden ze een sterke aardgeur, een ringetje om de steel en bovendien steriele randcellen. Doordat ik me blind staarde op het elzenbroek, zocht ik de oplossing in de richting van een *Telamonia* die typisch is voor dit biotoop. Ik zocht hulp bij zeer goede mycologen, maar niemand kon mij helpen. Gelukkig kwam ik op het idee om het over een andere boeg te gooien. Ik herinnerde me een artikel van P.B. Jansen (1977) over *Cortinarius rigidus* Fr., gemakkelijk herkenbaar aan de sterke grondgeur, en daar er een berkeboom stond bij de groeiplaats was ik uit het probleem en determineerde mijn vondst als *C. rigidus*.

Een tweede *Telamonia* die daar stond leek sprekend op de eerste, maar had geen ringetje, grotere sporen en daarbij ook geen cystiden. Nu was Drs. Huysman zo vriendelijk geweest om mij de Latijnse diagnose te sturen van *Telamonia alnetorum* Velen. Deze soort had grote sporen van 14 μm lang. Ik mat hooguit 13 μm bij mijn vondst. Kits van Waveren (1975) had ook over de soort geschreven. De langste sporen die Kits v. Waveren mat waren 10 μm lang. De sporen van de soort uit Siberie komen het dichtst bij die van Velenovský. Kits van Waveren's exemplaren stemmen wat dat betreft het meest met de opvatting van Moser overeen. De grote en duidelijke maar stompe umbo maken het echter wel mogelijk dat ik hier met *T. alnetorum* Velen (nu *Cortinarius alnetorum*) te maken heb.

Aan de hakhout-kant vond ik ook nog *Cortinarius hemitrichus* Fr. Aan *Galerina*'s vond ik er *G. ampullaceocystis*, *G. calyptrata* var. *clavipila*, *G. cerina* en een soort die ik voor *G. uncialis* hield. Maar sinds ik *Naucoria suavis* heb leren kennen weet ik het niet goed meer en zal ik een poging moeten doen om mijn determinatie te herzien. Natuurlijk waren *Naucoria escharoides* en *N. subconspersa* ook op het toneel.

Lactarius obscuratus was ook aanwezig. Bij het herkennen van *Collybia oedipus* en *C. peronata* ondervond ik veel gemak van de tabellen van Jansen en Noordeloos (1980). *Mutinus caninus*, een vochtminnende soort, liet zich er ook niet onbetuigd. *Marasmius rotula*, die ik daar ook vond, blijkt gepuncteerde sporen te hebben. Dit werd nergens in de door mij geraadpleegde literatuur vermeld. In betere tijden vond ik daar ook *Tricholoma sulphureum*, een sterk naar lichtgas ruikende ridderzwam en ook *Amanita virosa*.

LITERATUUR

- Kits van Waveren, E. (1975). Over 7 voor Nederland nieuwe gordijnzwammen - *Coolia* 18(2) : 76 - 84.
 Jansen, A.E. & Noordeloos, M.E. (1980). Sleutel tot de soorten van de genera *Marasmius*, *Collybia*, *Marasmiellus*, *Micromphale* en *Crinipellis* in Nederland, aangrenzend België en West-Duitsland - *Coolia* 23(1) : 2-9.
 Jansen, P.B. (1977). Over *Cortinarius rigidus* - *Coolia* 20(1) : 23-25.

K. Booy, Middenraai 69, 7912 TH Nieuweroord