

MYCOLOGISCHE NOTITIES

STEREUM SUBTOMENTOSUM OOK IN WEST-NEDERLAND

In Coolia 24(3) wordt bij de bespreking van "onze exkursies in 1980" vermeld dat *Stereum subtomentosum* Pouzar nog nooit is aangetroffen in moerasbosjes in het westen van ons land. In 1980 heb ik deze soort echter gevonden in het Naardermeer, tijdens een botanische inventarisatie-exkursie met mijn broer W.J. Reijnders. Op 9 augustus troffen wij daar in het reservaat "De Driehoek" een dood elzenstammetje aan, dat getooid was met tientallen vruchtlichamen van deze korstzwam. Ook in het Amsterdamse bos heb ik deze *Stereum*-soort inmiddels aangetroffen en wel op 16 september 1981 in een loofhoutbosje aan de noordzijde van het Wisentenkamp. Daar groeiden zes exemplaren op een dode loofhouttak. De houtsoort was niet nader te bepalen.

Stereum subtomentosum heb ik leren kennen tijdens een excursie met de N.M.V. in de Noordoostpolder en in het Speulderbos. De vondsten in het Naardermeer en Amsterdamse bos werden gedetermineerd op de volgende kenmerken : vruchtlichamen opvallend dun t.o.v. die van *Stereum hirsutum*; bij kneuzen tussen de vingers verkleuren de vingers chromaatgeel.

John Reijnders (Badhoevedorp)

COPRINUS VERRUCISPERMUS, een nieuwe inktzwam voor ons land

In Coolia 22(1), 1979, schreef ons erelid Dr. H.S.C. Huysman een artikel over ruwsporige *Coprini* en hun sporen. Uitvoerig wordt daarin ook de bouw van de merkwaardige sporen van bovenstaande soort beschreven. Vlak na het verschijnen van het artikel van Huysman zag Sterbeeckia 12 het licht, het orgaan van de Antwerpse Mycologische Kring. Hierin vinden we niet minder dan drie artikelen over ruwsporige inktzwammen. 't Zat dus wel in de lucht ! In het eerste artikel behandelen Imler en Springael *Coprinus phlyctidosporus* Romagn. Het tweede artikel gaat over een nieuwe soort : *Coprinus rugosobisporus*, van de hand van Geesink en Imler en in het derde laten Imler en Springael alle tot heden bekende ruwsporige *Coprini* de revue passeren, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de sporen; er staan zeer fraaie tekeningen in dit artikel. Wat nu de nieuwe soort *Coprinus rugosobisporus* betreft, dit is de soort die Geesink in Coolia 16(3) : 73