

Coolia 25(3), juli 1982

ONZE EXKURSIES IN 1981

J. DAAMS, *Zuidsingel 23, 1241 EH Kortenhoef*
J. FRENCKEN, *Joh. Geradtsweg 71, 1222 PN Hilversum*

SUMMARY

In 1981 the Dutch Mycological Society organised 23 forays, 7 of which had to be cancelled due to poor conditions for the mycoflora.

De weersomstandigheden in het voorjaar waren niet bepaald gunstig voor de ontwikkeling van de fungi. Van de drie geplande voorjaarsexkursies kon er geen enkele doorgang vinden. Maart was wel vrij vochtig doch april was bijzonder droog. Het daardoor ontstane neerslagtekort werd niet voor september ingehaald, zodat ook de zomer vrij droog was. Pas na september viel er voldoende regen.

EXKURSIES

18 juli, omgeving Lage Vuursche.

Het afwisselende terrein in de omgeving van Lage Vuursche (Drakesteijn en Pluismeertje) leverde een onverwacht rijke oogst op. In totaal werden er 111 soorten genoteerd. De zomerflora was al goed op gang gekomen: er werden 16 *Russula*- en 6 *Lactarius*-soorten aangetroffen naast ook nog 10 verschillende vezelkoppen. Uit het onderstaande lijstje blijkt dat verscheidene aardige soorten werden gevonden:

Agaricus bitorquis
Hydnoria tulasnei (GV)
Inocybe hirtella
Inocybe mixtilis
Inocybe ovalispora (v.Wi.)
Inocybe virgatula (Re)
Leucocoprinus brebissonii
Mycolachnea hemisphaerica
Otidea bufonia (Sw)
Oxyporus cf. obducens (St)

Paxillus atrotomentosus
Pluteus phlebophorus (Fr.)
Pluteus salicinus
Sepultaria tenuis (Sw)
Tarzetta catinus (Sw.)
Tuber rufum (GV)
Tyromyces chioneus (Fr)
Tyromyces ptychogaster
Vascellum pratense
Tephrocybe oldae (GV)

25 juli, Leemputten bij Staverden (Geld.)

Tijdens deze exkursie werden 99 soorten genoteerd, waaronder een aantal minder algemene soorten. De volgende worden hier genoemd:

<i>Cudoniella acicularis</i> (v. Wi)	<i>Hydnotria tulasnei</i> (GV)
<i>Dasyscyphus diminutus</i> (Sw)	<i>Hymenochaete rubiginosa</i> (Fr)
<i>Delicatula integrella</i> (PJ)	<i>Inocybe casimiri</i> (Fr)
<i>Dermocybe sphagnogena</i> (PJ)	<i>Inocybe lacera</i> f. <i>gracilis</i> (Ku)
<i>Entoloma fernandae</i> (Ku, L)	<i>Inocybe paludinella</i> (v. Wi)
<i>Entoloma lazulinum</i> (Ku, L)	<i>Peziza limnaea</i> (Sw)
<i>Entoloma rhodocylix</i> (Ku, L)	<i>Phaeomarasmium erinaceus</i>
<i>Entoloma sarcitulum</i> (Ku, L)	<i>Pholiota carbonaria</i> (Ku)
<i>Exidia albida</i>	<i>Russula claroflava</i>
<i>Galerina ampullaceocystis</i> (PJ)	<i>Scutellinia armatospora</i> (Ku en Sw)
<i>Rhodophyllus lividocyanulus</i> (GV)	<i>Scutellinia trechispora</i> (Sw)

1 augustus, Bossen in de Flevopolders.

Er werden 3 lijsten ontvangen resp. van kavel 51, 96 en 83 in het Bremerbergerbos met, zoals te verwachten was, een vrij groot aantal voor dit specifieke terrein opvallende soorten.

Kavel 96:

<i>Coprinus auricomus</i>	<i>Mycogone cervina</i> (CBS)
<i>Cortinarius romagnesii</i>	<i>Neobulgaria pura</i>
<i>Datronia mollis</i>	<i>Paecilomyces farinosus</i> (CBS)
<i>Exidia gemmata</i>	<i>Peziza badiofusca</i> (Sw)
<i>Helvella ephippium</i> (CBS)	<i>Peziza depressa</i> (v. Wi)
<i>Helvella villosa</i> (Tj)	<i>Peziza succosa</i> (Sw)
<i>Hymenogaster populetorum</i>	<i>Pluteus cinereofuscus</i> (L)
<i>Hypocrea aureoviridis</i> (CBS)	<i>Pluteus podospileus</i> (L)
<i>Inocybe posterula</i> (L)	<i>Pluteus romellii</i> (L)
<i>Inocybe squamata</i> (L)	<i>Pluteus thomsonii</i> (L)
<i>Sepultaria tenuis</i>	<i>Pluteus villosus</i> (L)

Voor kavel 51 worden nog de volgende soorten vermeld:

<i>Clavaria asterospora</i> (Tj)	<i>Peziza limnaea</i> (CBS)
<i>Coprinus urticicola</i> (Tj)	<i>Polyporus lentus</i>
<i>Hypoxylon serpens</i> var. <i>effusum</i> (v. Wi en CBS)	<i>Onygena cervina</i> (CBS)
<i>Incrustoporia semipileata</i>	

8 augustus. Bossen tussen Roden en Leek in NW-Drente.

Ondanks de droogte werd er toch een 80-tal soorten genoteerd. Daarvan noemen we hier de volgende: *Entoloma euchroum* en *E. minutum*., *Inocybe petiginosa*, *Mycena pelianthina* (L) en *Pholiotina filaris*.

29 augustus. Omgeving Udenhout.

In de omgeving van de kapel in de Udenhoutse bossen werd een 90-tal soorten genoteerd; in de omgeving van het terrein "de Brand" nog eens een 35-tal.

De volgende soorten zijn het vermelden waard:

<i>Xerocomus rubellus</i>	<i>Leucoscypha leucotricha</i>
<i>Coprinus verrucispermus</i>	<i>Tuber maculatum</i> (GV)
<i>Entoloma molliusculum</i>	<i>Eccilia paludicola</i>
<i>Asterophora lycoperdoides</i>	<i>Galerina jaapii</i>
<i>Asterophora parasitica</i>	<i>Marasmius limosus</i>
<i>Pluteus petasatus</i> (Aa)	<i>Hapalopilus nidulans</i>
<i>Resupinatus trichotus</i>	<i>Cudoniella clavus</i> (Sw)

5 september. Landgoed "de Geelders" bij Boxtel.

Tijdens deze exkursie werden 67 soorten genoteerd waarvan de volgende worden genoemd:

<i>Asterophora parasitica</i>	<i>Thelephora anthocephala</i>
<i>Panus tigrinus</i>	<i>Inocybe calospora</i>
<i>Naucoria alnetorum</i>	<i>Xerocomus parasiticus</i>
<i>Naucoria bohémica</i>	<i>Inocybe calamistrata</i>
<i>Naucoria salicis</i>	

12 september. Landgoed "Coelhorst" en "Birkhoven" bij Amersfoort.

Nog steeds is het paddestoelenseizoen maar matig. Er werden 63 soorten in deze over het algemeen toch rijke terreinen waargenomen. Als bijzonderheden worden *Leptosporomyces cf. ovoideus* en *Xerocomus spadiceus* vermeld.

26 september. Het Zwanewater te Callantsoog.

In dit van ouds bekende gebied werden 50 soorten genoteerd. Vermeldenswaard zijn de volgende soorten:

<i>Xerocomus rubellus</i>	<i>Entoloma cf. cyanulum</i>
<i>Clavulinopsis helveola</i>	<i>Entoloma undatum</i>
<i>Cortinarius erythrinus</i>	<i>Galerina subcerina</i>
<i>Cortinarius trivialis</i>	<i>Hygrocybe phaeococcinea</i>
<i>Cortinarius uliginosus</i>	<i>Hygrocybe strangulata</i>
<i>Entoloma cuspidiferum</i>	<i>Naucoria salicis</i>
<i>Entoloma serrulatum</i>	<i>Naucoria scorpioides</i>

26 september. "Het Planken Wambuis" bij Ede.

Tijdens deze exkursie werden 80 soorten genoteerd, waaronder slechts een enkele opvallende. Daarvan worden hier genoemd *Fomitopsis pinicola* en *Meruliopsis taxicola* (Det. St)..

17 oktober, "Strijpemonde" bij Oost-Voorne

In de bosjes van de duinen en in de binnenduinen werden in totaal 148 soorten genoteerd in "Strijpemonde"; in het "Overbos" 61 soorten.

In "Overbos" vielen de volgende soorten op:

<i>Clitocybe hydrogramma</i>	<i>Lepiota fulvella</i> (L)
<i>Geastrum triplex</i>	<i>Peziza limnaea</i> (Sw)
<i>Inocybe calospora</i>	<i>Pezizella alniella</i> (Sw)
<i>Inocybe hirtella</i>	<i>Poria romellii</i> (Za)
<i>Lactarius acerrimus</i>	

Voor "Strijpemonde" noemen we de volgende soorten:

<i>Agaricus meleagris</i>	<i>Lepiota alba</i>
<i>Ascocoryne cylichnium</i> (Sw)	<i>Lepista irina</i>
<i>Boletus luridus</i>	<i>Leucoagaricus sublittoralis</i>
<i>Bovista pusilla</i>	<i>Myriostoma coliforme</i> (Tj)
<i>Clitocybe barbularum</i> (L)	<i>Paxillus filamentosus</i> (L)
<i>Clitocybe foetens</i> (L)	<i>Peziza michelii</i>
<i>Clitocybe herbarum</i> (L)	<i>Peziza cf. violacea</i> (Sw)
<i>Cortinarius crystallinus</i>	<i>Phellinus hippophaecola</i>
<i>Entoloma leptopus</i>	<i>Psilocybe callosa</i>
<i>Entoloma cf. mougettii</i> (L)	<i>Stropharia coronilla</i>
<i>Inocybe agardhii</i> (L)	<i>Trametes trogii</i>
<i>Inocybe subbrunnea</i> (L)	<i>Trichophaea woolhopeia</i> (Sw)
<i>Lactarius euosmus</i>	

24 oktober AW-duinen bij Vogelenzang

Dit mooie terrein leverde weer de nodige verrassingen op. De deelnemers aan deze exkursie zullen zich nog lang de hoop oud hout herinneren waar, nogal verborgen, de zo spektakulaire *Heridium erinaceum* uitbundig voorkwam terwijl de oude stammen er omheen volop begroeid waren met *Auricularia mesenterica*.

Een verrassing was ook *Pleurotus lignatilis* die bij voorkeur voorkomt in holle populierenstammen. Dit was ook hier het geval, waar deze soort op dezelfde plaats al zo'n 25 jaar voorkomt.

Daarnaast werden de volgende soorten nog aangetroffen:

Agaricus impudicus
Coprinus extinctorius
Galerina uncialis
Geastrum coronatum
Hygrophorus persoonii
Inocybe serotina
Lepiota pseudohelveola

Lepiota subincarnata
Lepiota sublittoralis
Mycena tenerrima
Russula emetica var. *longipes*
Russula livescens
Russula brunneoviolacea

31 oktober, Maarsseveense plassen.

In dit oorspronkelijk broekbosgebied (later, in verband met zandwinning en ontwikkeling van een recreatiegebied gemengd met allerlei aangeplante boomsoorten) werden 125 soorten gevonden. Een bloemlezing uit de lijst levert het volgende resultaat op:

<i>Cyathicula coronata</i> (Za)	<i>Crepidotus epibryus</i> (Aa)
<i>Tuber maculatum</i>	<i>Lepiota josserandii</i>
<i>Agaricus haemorrhoidarius</i> (Aa)	<i>Lepiota scobinacea</i>
<i>Agaricus langei</i>	<i>Lepiota subincarnata</i>
<i>Clavariadelphus fistulosus</i>	<i>Lepista saeva</i>
<i>Clavariadelphus junceus</i>	<i>Naucoria cephalescens</i>
<i>Coprinus lagopus</i> var. <i>sphaerosporus</i>	<i>Nidularia farcta</i>
<i>Cortinarius privignoides</i> (Aa)	<i>Pluteus alborugosus</i> (Re)
<i>Cortinarius</i> cf. <i>punctatus</i>	<i>Ramaria ochraceo-virens</i>
<i>Cortinarius romagnesii</i>	<i>Russula atrorubens</i>
<i>Cortinarius saturninus</i> var. <i>bresadolae</i>	<i>Steccherinum robustior</i> (St)

7 november. Duingebied bij Schoorl.

De laatste exkursie van het seizoen leverde 107 soorten op. Daarvan noemen we de volgende:

<i>Baeospora myosura</i>	<i>Inocybe cincinnatula</i> (L)
<i>Cordyceps ophioglossoides</i>	<i>Inocybe kuehneri</i> (L)
<i>Cortinarius elatior</i> (L)	<i>Ischnoderma benzoinum</i>
<i>Entoloma vinaceum</i> var. <i>vinaceum</i> (Be)	<i>Lepiota aspera</i>
<i>Fayodia pseudoclusilis</i> (L)	<i>Lepiota josserandii</i> (L)
<i>Hemimycena cucullata</i>	

Herbaria.

Aa = Dr. H.A. v.d. Aa; L = Rijksherbarium Leiden; Re = Dr. A.F.M. Reynders; W = Biol. Station Wijster; Be = F.J. v.d. Bergh; Fr = J. Frencken; P.J. = P.B. Jansen; v. Wi = P. v. Winden; Sw = Mevr. R. Swart-Velthuysen; Tj = Dr. Fr. Tjallingii; St = Dr. J.A. Stalpers; Ku = Drs. Th. Kuyper; GV = Dr. G.A. de Vries; Vu = M. van Vuure; Za = Drs. G. van Zanen.