

4. De sporen van zowel *Schizophyllum* als *Auriculariopsis* zijn tweekernig, maar er zijn vier kruisingstypen, die morfologisch te onderscheiden zijn en een bijzonder onaangename lucht verspreiden.

Resumerend zijn de volgende conclusies van belang:

*Schizophyllum*, *Auriculariopsis* en *Cytidiella* zijn zeer nauw verwant en moeten in dezelfde familie worden geplaatst en zeker niet in verschillende ordes. *Schizophyllum* is zeker niet verwant met de Lentinaceae, zoals gesuggereerd wordt door Jülich (1981). In Jülich's systeem zouden de Meruliales een synoniem worden van de Schizophyllales. Hier verder op ingaan vereist echter een geheel ander artikel.

#### LITERATUUR

- Bourdot, H. & A. Galzin, 1928 - Hyménomycètes de France. Sceaux, 761 pp.  
 Butler, L.F., 1927 - Increasing prevalence of Hypochynus rot of apples. *Phytopathologia* 17: 743-744.  
 Butler, L.F., 1930 - Corticium centrifugum, a heterothallic pathogen of apples. *J. agric. Res.* 41: 269-294.  
 Chea, C.C., 1936 - Tan spot rot of Peili (*Pyrus bretschneideri* Rehd.). *Bull. Chin. bot. Soc.* 22: 1-15.  
 Donk, M.A. 1930 - Revisie van de Nederlandse Heterobasidiomycetae en Homobasidiomycetae-Aphyllaphoraceae I. *Meded. ned. mycol. Ver.* 18-20: 68-200.  
 Donk, M.A. 1959 - Notes on "Cyphellaceae" I. *Persoonia* 1: 25-110.  
 Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1975 - The Corticiaceae of North Europe 3: 287-546.  
 Eustace, H.J. 1903 - Two decays of stored apples. I. Another apple rot following scab. *Techn. Bull. N.Y. St. agric. Exp. Stn* 235: 123-129.  
 Jülich, W., 1981 - Higher taxa of Basidiomycetes. J. Cramer, Vaduz, 485 pp.  
 Möller, F.H., 1942 - *Cytidia flocculenta* (Fr.) v. Höhn. et Litsch. (*Poppel-Baegerøre*). *Friesia* 3: 67-68.  
 Pouzar, Z., 1954 - *Cytidiella melzeri* g.n. et sp. n., nový typ resupinatních hub čišovcovitých. *Česká Mykol.* 8: 125-129.  
 Weresub, L.K. & W.I. Ilman, 1980 - *Corticium centrifugum* reisolated from fisheye rot of stored apples. *Can. J. Bot.* 58: 137-146.

\* \* \* \* \*

"Onder de klok van de NCB-afslag in Velthoven worden vandaag voor het eerst in ons land, Shii take geveild" zo meldde het Eindhovens Dagblad van 8 augustus i.l. Uit het bericht blijkt verder dat het om een eenmalige kweek gaat, door een voormalige stagiaire van het proefstation te Horst. Het is overigens niet de eerste keer dat Shii take in Nederland wordt gekweekt. Verschillende min of meer geslaagde nederlandse kweken van deze houtbewoner uit Azië haalden dan wel niet de krant, maar bewezen toch dat het mogelijk moet zijn om deze soort ook hier te laten groeien en fructificeren. Vooruitlopend op een mogelijk grotere bekendheid van deze paddestoel in ons land signaleren we toch alvast het probleem van de nederlandse naam. De betrokken krantenpublicatie noemde de soort "Chinese zwam"; misschien aanvaardbaar, maar voor de meeste nederlandse die de paddestoelen ooit zagen en/of aten zal toch de herkomst niet China maar Japan zijn geweest. Overigens zijn we maar ternauwernood ontsnapt aan de consument-onvriendelijke naam "Eetbare taaiplaat". Want Pegler heeft de soort net op tijd uit *Lentinus* (Taaiplaat) naar het nieuwe genus *Lentinula* overgebracht. Laten onze naamgevende specialisten zich nu de kans niet laten ontglippen om voor dit in onze taal nog onbenoemde geslacht een naam te verzinnen die ook de mensen in Horst e.o. met wat meer instemming kunnen begroeten.