

VERENIGINGSNIEUWS

NIEUWJAARSVERGADERING ("DAG VAN BAARN") te GOUDA

en

JAARVERGADERING te UTRECHT

Op zaterdag 12 januari 1985 organiseert de vereniging de jaarlijkse nieuwjaarsvergadering ("Dag van Baarn") te Gouda. Zij die op deze dag een (korte) mededeling willen doen worden verzocht zich schriftelijk aan te melden bij Annelies Jansen, Biologisch station, Kampsweg 27, 9418 PD WIJSTER. Graag titel van de mededeling vermelden en de tijdsduur in minuten. Liefst ook zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór 1 november.

De Jaarvergadering, in het Botanisch Labotatorium te Utrecht, zal worden gehouden op zaterdag 23 maart.

Van beide vergaderingen zal het programma worden opgenomen in de Coolia die omstreeks 1 januari zal verschijnen.

MICROSCOPIEDAG VOOR GEVORDERDEN

Op zaterdag 8 december 1984 zal in de zaal van Madoera, nabij het Centraalbureau voor Schimmelcultures in Baarn, de microscopiedag voor gevorderden worden georganiseerd. Het programma van die dag zal geheel gewijd zijn aan de studie van de Aphylophorales. Aanleiding voor dit gespecialiseerde programma is de verschijning van het deeltje over Aphylophorales in de Kleine Kryptogamenflora van dr. W. Jülich.

Mycologen met belangstelling voor deelname aan deze studiedag worden verzocht zich op te geven bij de secretaris van de Floracommissie, dr. M.E. Noordeloos, Rijksherbarium, Schelpenkade 6, 2313 ZT Leiden. De opgavetermijn sluit op 15 november. Het definitieve programma kan daarna worden opgesteld.

Verzoek om medewerking

Ondergetekende is zeer geïnteresseerd in het vinden van vers materiaal van een *Stilbella*-achtige schimmel, die zou voorkomen op rottende paddestoelen. *Stilbella* is een geslacht dat behoort tot de Fungi imperfecti, en is gekenmerkt doordat de conidiën gevormd worden aan zgn. synnemata: dat zijn bundels van met elkaar vergroeide hyfen die, zijdelings of aan de top, conidiën vormen. Deze synnemata staan vaak loodrecht op het substraat en zijn macroscopisch of met een loupe te zien als kleine haartjes, die door de aanwezigheid van veel sporen aan de top opgezwollen kunnen zijn.

De betrokken soort komt, zoals gezegd, voor op rottende paddestoelen en is o.a. aangetroffen in herbariumcollecties van *Collybia tuberosa*. Het is onwaarschijnlijk dat de *Stilbella* iets met deze *Collybia* te maken heeft, maar het samen voorkomen zegt wel iets over het stadium van rot waarin met succes naar de *Stilbella* kan worden uitgekeken.

Omdat het de bedoeling is van een eventuele nieuwe vondst meteen reïncultures te maken, zou

toezending van materiaal van rottende paddestoelen met *Collybia tuberosa* en verwanten in verse toestand zeer op prijs worden gesteld.

Keith Seifert
Centraalbureau voor Schimmelcultures
Postbus 273
3740 AG Baarn