

LITERATUUR

- Bondartsev, A.S. (1953). The Polyporaceae of the European USSR and Caucasia. (Engelse vertaling, Jeruzalem 1972).
- Bruinsma, V. (1906). Eetbare en vergiftige paddestoelen. Groningen.
- Donk, M.A. (1933). Revision der Niederländischen Homobasidiomycetae-Aphylllophoraceae I. Meded. Ned. Myc. Ver. 22.
- Jülich, W. (1984). Die Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. In Gams, K. Kryptog. Fl. II b/l. Stuttgart.
- Murrill, W.A. (1915). Tropical Polypores (reprint J. Cramer, 1973).
- Overholz, L.O. (1953). The Polypores of the United States, Alaska and Canada. Oxford.

Coolia 28(2), april 1985

VERSLAG VAN DE WERKWEEK IN BAKKEVEEN (OCTOBER 1984)

ELISABETH JANSEN, *Rijkinst. voor Natuurbeheer, Kempenbergerweg 67, 6816 RM Arnhem*

SUMMARY

An account is given of the results of a mycological foray in Bakkeveen, prov. Friesland, the Netherlands, in October 1984. Rare and/or interesting species are listed according to the localities visited. During the week two new species to the Dutch agaric flora have been found viz. *Entoloma scabrosum* (Fr.) Noordel. and *Pseudobaeospora pillodii* (Quél.) S. Wasser.

Van 20 tot 27 oktober 1984 werd een werkweek georganiseerd in Bakkeveen (Friesland) waaraan door 16 personen werd deelgenomen. We verbleven in het Natuurvriendenhuis Allardsoog: goede huisvesting met een centrale werkruimte om te determineren. Uit vragen van leden bleek dat niet iedereen weet wat zo'n Nederlandse werkweek inhoudt en hoe ver je met de mycologie gevorderd moet zijn om eraan te kunnen deelnemen. Om met het laatste te beginnen: iedereen die belangstelling heeft voor de studie van paddestoelen en in het bezit is van een microscoop kan aan een werkweek deelnemen. Het werken in één centrale ruimte, zoals in het Natuurvriendenhuis, met enkele deskundigen in de buurt, blijkt stimulerend te werken voor diegenen die nog niet zo thuis zijn in het gebruik van microscoop en literatuur. 's Morgens worden er excursies gehouden, de middagen en avonden worden besteed aan het determineren van de verzamelde paddestoelen. bijzondere vondsten worden tentoongesteld en in grotere kring besproken.

Tot slot een overzicht van de bezochte terreinen en de bijzondere vondsten. Tijdens de werkweek werden twee nieuwe soorten voor Nederland gevonden:

Overzicht van de terreinen met de aangetroffen bijzondere soorten.

Terreinen	Bijzondere soorten
Duurswouderbos ten Z. van Bakkeveen	<i>Galerina cephalotricha</i> <i>Mycena adonis</i> var. <i>adonis</i> <i>Russula raoultii</i>
Duurswouder hiede ten ZW van Bakkeveen	<i>Mutinus ravenelii</i> <i>Mycena capillaris</i> <i>Rutstroemia echinophila</i>
Mandeveld ten O. van Bakkeveen	<i>Galerina cephalotricha</i> <i>Gymnopilus fulgens</i> <i>Hyphoderma argillaceum</i>
Loopstra's Heide ten W. van Duurswoude	<i>Galerina cephalotricha</i> <i>Gymnopilus fulgens</i> <i>Mycena adonis</i> var. <i>adonis</i> <i>Resupinatus kavinii</i>
Zuurse Duinen ten N. van Een	<i>Naucoria luteolofibrillosa</i>
Het Blauwe Bos ten Z. van Haulerwijk	<i>Cystoderma carcharias</i> <i>Hypholoma myosotis</i>
Bos achter het Witte Huis - Olterterp	<i>Asterophora parasitica</i> <i>Cantharellus tubaeformis</i> var. <i>tubaeformis</i> <i>Hydnum repandum</i> <i>Osmoporus odoratus</i>
Heidehuizen - Olterterp	<i>Cortinarius rigidus</i> Fr. ss. Kühn. & Romagn. <i>Osmoporus odoratus</i>
Mensinghe Bos ten Z. van Roden	<i>Boletinus cavipes</i> <i>Cortinarius elatior</i> <i>Kneiffiella alutacea</i> <i>Kneiffiella quercina</i> <i>Mycena capillaris</i> <i>Suillus variegatus</i> <i>Peckiella viridis</i> (Pyrenomycete op <i>Russula</i>)
Natuurschoon ten N.W. van Roden	<i>Cantharellus tubaeformis</i> var. <i>tubaeformis</i> <i>Lactarius serijluus</i> ss. str. <i>Tephroclybe rancida</i>

Norgerholt ten Z. van Norg

Phellinus ferreus

Bosje bij Foxwolde

Cortinarius alnetorum

Compagnonsbossen ten N. van Ravenswoud
(door dit terrein loopt een fietspad
verhard met schelpen)

Agaricus semotus
Cortinarius elatior
Hygrocybe acuticonica var. *acuticonica*
Hygrocybe laeta
Inocybe dulcamara
Inocybe friesii
Inocybe griseolilacina
Inocybe oblectabilis
Lepiota castanea
Lepiota ventriosospora
Lycoperdon molle

Kerkhof Fochteloo

Clavaria vermicularis
Entoloma serrulatum
Geoglossum fallax
Hemimycena delectabilis
Hygrocybe coccinea
Hygrocybe insipida

Coendersbos ten Z. van Nuis

Ceriporia viridans
Datronia mollis
Grifola frondosa
Hymenoscyphus albidus

Fogelsanghstate ten Z. van
Veenklooster

Amanita crocea
Cortinarius elatior
Flammulaster subincarnatus

Ballastplaat - Lauwerszeepolder

Clavaria daulnoyae
Conocybe dunensis
Inocybe variispora prov.
(een onbeschreven soort die één keer eerder
in Nederland is gevonden).




Fig. 1. *Entoloma scabrosum* (Fr.) Noordel. - Roden, Natuurschoon, leg. F. Benjaminsen, oct. 1984. Habitus x 1.5; sporen x 2000.

1. *Entoloma scabrosum* (Fr.) Noordeloos. (Fig. 1). Deze soort is nauw verwant aan *E. anatinum* en *E. griseocyaneum*, verschilt echter in hoedvorm met centrale deuk, doorschijnend gestreepte hoedrand, minder intens blauwe steel die bijna niet vezelig gestreept is en groeiplaats in moerasbos. Een beschrijving komt in de *Flora agaricina neerlandica* deel 1, die hopelijk nog dit jaar in druk verschijnt. Vindplaats: Natuurschoon, Roden.

2. *Pseudobaeospora pillodii* (Quél.) S. Wasser. Een kleine paddestoel met zeer donkere violetgrijze hoed, steel en lamellen. Vanwege de kleurloze, dextrinoïde sporen en de vrije lamellen worden de soorten van dit geslacht in de familie der Agaricaceae geplaatst in de buurt van *Lepiota*. Vindplaats: Oudehornstercompagnie.