

LITERATUUR

- Boudier, E. (1905-1910). *Icones Mycologicae*. Deel I-IV; Parijs.
- Dennis, R.W.G. (1968). *British Ascomycetes*. J. Cramer, Lehre.
- Dissing, H. (1966a). A revision of collections of the genus *Helvella*. L. ex. St-Amans emend. Nannf. in the Boudier Herbarium. *Revue de Mycologie* 31: 189-224.
- Dissing, H. (1966b). The genus *Helvella* in Europe. *Dansk Botanisk Arkiv Band* 25, nr. 1.
- Koppers, H. & Hofman, J. (1984). Onderzoek naar de samenstelling van slib van het zuiveringsbedrijf van de Gemeente Bedrijven Venlo. KIWA N.V., Vakgroep Procestechnologie; Nieuwegein.
- Smith-Weber, N. (1972). The genus *Helvella* in Michigan. *The Michigan botanist* 11: 147-201.
- Stroucken, A. (1959). Het nieuwe pompstation van het waterleidingbedrijf der gemeente Venlo. *Water* 43: 259-270.

LEUCOCOPRINUS BREBISSONII (Godey) Locq.

In 1972 vond-ik bovenstaande soort voor het eerst in een voormalig hakhoutbosje te Nieuweroord. Het waren slappe, derhalve liggende exemplaren. Het kostte mij grote moeite om tot een goede soortbepaling te komen. Maar met een *Lepiota*-tabel uit een van de eerste uitgaven van Coolia lukte het.

De laatste tijd kom ik de soort geregeld tegen in een 20 jaar oud *Larix*-bosje in Nieuweroord. Hiervan heb ik materiaal verzameld en dia's gemaakt. Verleden herfst zag ik een opbloei van de soort in een *Picea*-singel tussen een weggetje en tuintjes naast de ger. kerk van Noordscheschut. Volgens de 'Standaardlijst' komt *L. brebissonii* vooral in de duinen voor. Wildervanck meldde een vondst in een *Picea* bos in Drenthe. (1950). Het schijnt dus dat deze soort zich ook buiten het duingebied aardig heeft aangepast. K. Booij.

In een proefvlakte in een Pino-Quercetum in Polen werden 10 jaar achter elkaar consequent alle vruchtlichamen van *Collybia peronata* verwijderd. In een vergelijkbaar stuk bos werden de vruchtlichamen alleen maar geteld en gemerkt. Vastgesteld werd dat deze rigoreuze pluk nòch het aantal vruchtlichamen nòch de frequentie van verschijnen had beïnvloed. (Irena Holownia, in: *Acta Mycol.* 19, (1): 121-128. 1983 (in 1984).

Naar uit onderzoek in N. Italië gebleken is heeft de Knoflookvlieg *Suillia univittata* twee generaties per jaar. De voorjaarsgeneratie tast de Knoflook aan maar de tweede generatie, in de herfst, leeft op de truffel *Tuber magnatum* Pico, een soort die sterk naar knoflook ruikt. Hopelijk komen de knoflooktelers nu niet op de gedachte dat ze de schade aan hun gewas kunnen beperken door de betrokken truffel te gaan bestrijden. Ciampolini, M. & L. Suss, in *Boll. Zool. Agrar. Bachic.* 17: 7-38 1982/83 (in 1984).