

Coolia 30(4) oktober 1987

DE WERKWEEK 1986 IN VEERE

JAN WILLEM JONGEPIER, *Middelburgsestraat 27, 4388 NS Oost-Souburg*

SUMMARY

A report is given of the foray of the Dutch Mycological Society at Veere, Zeeland, Southwestern Netherlands, in October 1986. A list is given of the most interesting fungi found during the week, among which several species that are new to the Dutch checklist.

De jaarlijkse binnenlandse werkweek van de NMV werd in 1986 gehouden van 10 t/m 17 oktober, en wel in Veere, een stadje op het voormalige eiland Walcheren in de provincie Zeeland. In deze provincie is relatief weinig naar paddestoelen gekeken. Alleen Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Beveland en delen van Walcheren en Schouwen zijn behoorlijk goed onderzocht, hetzij door daar wonende mycologen, hetzij tijdens zaterdagexcursies.

Zeeland is mycologisch gezien een merkwaardige provincie omdat de bodem er voor het grootste deel uit zware zeelei bestaat. Veel algemene soorten ontbreken geheel of vrijwel geheel en de kans op méér zeldzame soorten lijkt (daardoor) groter te zijn dan in de rest van het land. Wellicht is de mycoflora nog het meest te vergelijken met die van de IJsselmeerpolders.

De deelname aan de werkweek was goed te noemen. De eerste dag waren er 12 deelnemers en het maximum halverwege de week bedroeg 18. Het totale aantal deelnemers was 22. De eerste dagen werden de terreinen gezamenlijk bezocht. Op twee dagen werd de groep in tweeën gesplitst. Bezocht werden kleibossen, binnenduinrandbossen, duingraslanden en vochtige graslanden. Door de grote droogte van de voorgaande weken leverden de terreinen (met uitzondering van de vochtige graslanden) geen lange soortenlijsten op.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste feiten van de excursieweek, in chronologische volgorde. Bij de nomenclatuur is uitgegaan van de Standaardlijst (Arnolds, 1984) met uitzondering van de geslachten *Inocybe* p.p. en *Psathyrella*, waarvoor de monografieën van Kuyper (1986) resp. Kits van Waveren (1985) werden aangehouden.

De eerste dag werden het Oranjesbosch en Oranjezon bezocht, een binnenduinrandbos resp. een duingebied met afwisselend licht-kalkarme en kalkrijke stukken, struweel, loof- en naaldbos. Een kalend duingrasland nabij een kanaal voor wateronttrekking leverde meteen al twee bijzondere vondsten op. *Galerina embolus* (Fr.) Orton als nieuwe soort voor Nederland, samen met de zeer zeldzame

Mycenella salicina, die er in grote hoeveelheid stond. Andere bijzondere vondsten waren *Inocybe subporospora*, *Pluteus umbrosus*, *P. atromarginatus* en *Tyromyces fragilis*.

Rammekenshoek is een natuurreservaat ten oosten van Vlissingen. Het omvat een 40 jaar oud bos op vochtige klei, zilte krekken en een extensief begraasd weiland. Er werden veel *Pluteus*-soorten gevonden, waaronder *P. hispidulus* en soorten die in "de polders" algemeen zijn, zoals *P. podospileus* en *P. villosus*. Langs een pad stond vrij veel *Lactarius acerrimus*. Tevens werden in het bos *Entoloma speculum*, *Pholiotina dentatomarginata* en *Bolbitius reticulatus* gevonden en in het weiland *Lepista rickenii*.

Het reservaat Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland) is enigszins vergelijkbaar met dat van Ritthem, het is alleen jonger: 25 jaar oud. Aan het bezoek werd een korte wandeling door een paardenwei op een oude dijk toegevoegd. Het reservaat leverde in eerste instantie weinig voldoening, maar bij determinatie van het verzamelde materiaal kwam er nog een aardig aantal bijzonderheden uit. Er was één nieuwe soort voor Nederland bij: een *Galerina*-achtig paddestoeltje dat *Simocybe laevigata* (Favre) Orton bleek te zijn. Verder werden hier gevonden: *Coprinus plagioporus*, *Pholiotina dentatomarginata*, *Inocybe hypothaea*, *I. appendiculata*, *Psathyrella lutensis*, *Calocybe obscurissima* en *Mycoacia fuscoatra*. Uit het paardenweitje kwamen als belangwekkende soorten *Psilocybe callosa*, *Psathyrella narcotia* en *Panaeolus campanulatus*.

Hoogtepunt van de werkweek was het bezoek aan De Schotsman, een in 1961 drooggevalle plaat in het huidige Veerse Meer. Naast jong loofbos komt hier een grote oppervlakte vochtige, kalkrijke graslanden voor met kruipwilg- en ook wel duindoornstruweel. Opvallend voor het laatste terreintype was het grote aantal *Hebeloma*'s, ondermeer *H. testaceum*, *H. dunense* en - nieuw voor Nederland - *H. psammophilum* Bon. Deze lijkt veel op *H. mesophaeum*, maar heeft sporen die langer zijn dan 10 µm. Daarnaast werd hier de sterk aan *Cortinarius rigidus* verwante *C. albonigrellus* Favre gevonden, evenmin tot nu toe bekend van ons land. Overige lekkernijen waren *Dermocybe pratensis*, *Cortinarius saturninus* var. *bresadolae*, *Clavaria tenuipes*, *C. daulnoyae*, *Hygrocybe acutoconica*, *Leptoglossum griseopallidum*, *Helvella corium*, *Entoloma sericeonitidum*, *Pholiotina brunnea*, *Conocybe brunneola*, *Inocybe agardhii*, *Galerina badipes*, *Lopharia spadicea* en in of bij het bos: *Calocybe ionides*, *Flammulaster carpophilus*, *Tomentella galzinii* Bourd. - de vijfde première voor ons land -, *T. subtestacea* (beide op elzetakken) en *Mycoacia aurea*.

De woensdag werd besteed aan verschillende terreinen in het duingebied tussen Vrouwenpolder en Domburg. De droogte had hier duidelijk toegeslagen. Als

zeldzaamheden werden genoteerd *Psathyrella leucotephra*, *P. frustulenta*, *P. cf. obtusata*, *Conocybe brunneola*, *Entoloma leptonipes* en *Mycoacia fuscoatra*.

Ook de vroongronden, sterk ontkalkte duingraslanden, in de Kop van Schouwen, waren zeer droog. Niettemin konden hier nog enkele bijzondere paddestoelen worden gevonden: *Inocybe acutella*, *I. agardhii*, *Psathyrella panaeoloides*, *P. nolitangere*, *Poronia punctata*, *Kneiffiella quercina* en *Sordaria macrospora*, een pyrenomycete op paardemest. Ter aanvulling werd De Schelphoek bezocht, een natuurreservaat met jong loofbos en vochtige kalkrijke graslanden. Dit leverde weer *Pholiotina dentatomarginata* op, alsmede *Simocybe sumptuosa*, *Coprinus galericuliformis* en *Inocybe squarrosa*.

De deelnemers zullen met genoegen terugdenken aan deze geslaagde werkweek, niet in de laatste plaats vanwege de hartelijke en gezellige sfeer die er in het kamphuis tot soms na het middernachtelijk uur heerste.

LITERATUUR

Arnolds, E. (1984). Standaardlijst van Nederlandse macrofungi. *Coolia* 26, Suppl., 362 pp.

Kits van Waveren, E. (1985). The Dutch, French and British species of *Psathyrella*. *Persoonia Supplement* 2. 300 pp.

Kuyper, Th. W. (1986). A revision of the genus *Inocybe* in Europe. I. Subgenus *Inosperma* and the smooth-spored species of subgenus *Inocybe*. *Persoonia Supplement* 3. 247 pp.

THE MYCOLOGIST

In het begin van dit jaar verscheen er een nieuw mycologisch tijdschrift, *The Mycologist*, uitgegeven door de British Mycological Society als opvolger van het *Bulletin of the British Mycological Society*. Het tijdschrift is op papier van goede kwaliteit gedrukt, wat de weergave van de vele opgenomen foto's ten goede komt. In de eerste twee afleveringen verschenen in de serie "Profiles of Fungi" kleurenfoto's van *Hypoxylon fragiforme*, *Gerronema postii*, *Boletus purpureus* en *Pleurotus dryinus*. Van de interessantere bijdragen uit deze afleveringen kunnen genoemd worden: Wettelijke aspecten van het verzamelen van paddestoelen op excursie; over het ascomycetengeslacht *Cyttaria*; mycologie in het oude China; en een uit het Deens vertaalde sleutel van *Ganoderma* in Noord Europa met beschrijvingen van 6 soorten. Ruime aandacht wordt verder geschonken aan verslagen van excursies van onze Engelse zustervereniging en aan gevarieerd mycologisch nieuws. Ook voor de rubriek *Gastronomie* van Roger Phillips zal ongetwijfeld belangstelling bestaan.

Dit kleurrijke tijdschrift verschijnt 4 maal per jaar. Als associate member van de British Mycological Society betaal je slechts £ 5,- per jaar. Inlichtingen over het lidmaatschap bij ondergetekende. Een foldertje met intekenstrook wordt met deze *Coolia* meegestuurd. -- Th. W. Kuyper.