

Coolia 32(2), april 1989

VERSLAG VAN DE WERKWEEK IN MARIENTHAL, LUXEMBURG

F. BENJAMINSEN, *Mullerweg 23, 5623 JC Eindhoven*

De buitenlandse werkweek van 1988 vond plaats van 24 september tot 1 oktober, in Marienthal, Luxemburg. We waren daar gehuisvest in een voormalig klooster, gelegen aan het riviertje de Elsch temidden van steile, beboste hellingen, op slechts twee kilometer afstand van het dorpje Hollenfels, waar een goede eetgelegenheid was.

We beschikten over drie grote en twee kleinere werkruimten en in de kelder was een grote keuken waar we gezellig bijeen konden komen om te eten en te drinken. De slaapkamers waren 2 tot 5 persoons met goede bedden.

In dit deel van Luxemburg zijn veel diepe dalen met beekjes en hellingbossen. Onze Luxemburgse vrienden Guy Marson en Mw. C. Besch voorzagen ons van informatie over geschikte terreinen, die echter niet allemaal even rijk waren aan fungi. Afwisseling was er genoeg, al hebben we het meest verzameld in eiken-haagbeukenbos, eiken-beukenbos, sparrebos en een enkel denneperceel. Heel typisch voor het gebied zijn de zogenaamde "Mardellen", kleine moerassige laagten. In de ondergrond wordt hier en daar kalk aangetroffen. Deels door deze grote variatie vonden we toch rond de 680 soorten, hetgeen voor een werkweek een recordaantal is.

De naaste omgeving van Marienthal bleek nog de beste excursieterreinen te bieden. Drie maal, en ook nog eens privé, werd de zg. "Himel" bezocht. Dit is een landschappelijk gezien niet zo'n fraai stuk gemengd bos, dat zeer rijk aan paddestoelen was. Opvallend was het voorkomen van *Russula luteotacta*, die we aanvankelijk voor *R. sanguinea* hielden.

Het dal bij Glabech met de Bolleschbaach leverde veel *Cortinarius* soorten op (wel 25), waaronder diverse *Phlegmaciums*. Andere rijke gebieden waren het dal van de Mamer en het Buchholz, beide ten oosten van Marienthal. De lijst van bijzondere soorten is erg lang. Ziehier de aantallen soorten van de volgende geslachten: *Amanita*: 10; *Clitocybe*: 15; *Cortinarius*: 25; *Inocybe*: 22; *Lactarius*: 34; *Mycena*: 28; *Russula*: 50; *Tricholoma*: 11; *Peziza*: 10. Ook was er geen gebrek aan clavarioïde fungi. Boleten zijn er maar weinig gevonden. De Aphyllophorales sloegen met 125 soorten geen slecht figuur, evenals de Ascomyceten met 75 soorten.

Al met al was dit een gebied, en een onderkomen waar we beslist nog eens naar toe moeten.

MEDEDELINGEN

Werkweek in Ierland

Van vrijdag 8 tot zondag 17 september aanstaande zal in Roscrea, Co. Tipperary in Ierland de jaarlijkse vergadering en aansluitende werkweek van de British Mycological Society