

beschouwd moet worden. Ook het genus *Erinella* wordt door Korf (1973) m.i. terecht beschouwd als een synoniem van *Dasyscyphus*.

In dezelfde lijst met synoniemen (Dixon, l.c.) staat als mogelijk synoniem *Erinella aeruginosa* Henn. genoemd. Dixon kon een waarschijnlijk isotype hiervan bestuderen, en had op grond hiervan het sterke vermoeden dat de fungi die door Von Albertini en Von Schweinitz resp. Hennings beschreven werden conspecifiek zijn. Omdat er echter geen typemateriaal te vinden was van *Peziza sericea* houdt hij het bij deze uitspraak. Na vergelijking van de oorspronkelijke beschrijvingen lijkt het er inderdaad sterk op.

Voor wat betreft de twee Nederlandse vondsten lijkt het me het juiste om deze onder de naam *Dasyscyphus sericeus* (Alb.&Schw.:Fr.) Sacc. op te bergen, om de diverse hierboven genoemde redenen. Bovendien is dit de oudste beschreven soort die bovendien nog door Fries gesanctioneerd wordt.

Met dank aan Frans Ligtenberg die mij informatie over zijn vondst verstrekke.

LITERATUUR

- Albertini, J.B. von & Schweinitz, L.D. von (1805). *Conspectus fungorum in Lusatae superioris agro niskiensis crescentium e methodo Persooniana*. Leipzig.
- Dennis, R.W.G. (1962). A reassessment of *Belonidium* Mont.&Dur. *Persoonia* 2:171-191.
- Dixon, J.R. (1974). *Chlorosplenium* and its segregates. 1. Introduction and the genus *Chlorosplenium*. *Mycotaxon* 1:65-104.
- Dixon, J.R. (1975). *Chlorosplenium* and its segregates. 2. The genera *Chlorociboria* and *Chlorencoelia*. *Mycotaxon* 1:193-237.
- Fries, E.M. (1822). *Systema mycologicum* 2(1). Lund.
- Hennings, P.C. (1906). Dritter Beitrag zur Pilzflora des Gouvernements Moscou. *Hedwigia* 45:22-33.
- Korf, R.P. *Discomycetes and Tuberales. The Fungi: an advanced treatise* (eds. Ainsworth, G.C., Sparrow, F.K. & Sussman, A.S.) vol. IVa:249-319.
- Ligterink, W. (1989). *Erinella aeruginascens* was de naam. *Coolia* 32:21-23.
- Lorton, J. (1914). Etude sur quelques discomycetes nouveaux. *Bull.Soc.Myc.Fr.* 30:227.
- Quélet, L. (1886). *Enchiridion fungorum*.
- Röllin, O. & Anthoine, A. (1988). *Belonidium sericeum* (Alb.&Schw.) Lorton. *Bull. trim. fed.myc. Dauphiné Savoie* 111:14.
- Saccardo, P.A. (1889). *Sylloge fungorum*. vol. VIII.

Coolia 32(4), oktober 1989

HET PROJECT 'VOORLOPIGE VERSPREIDINGSATLAS VAN MACROFUNGI IN NEDERLAND'

Marijke Nauta, Hansenstraat 70, 2316 BM Leiden

Else C. Vellinga, Anton Mauvestraat 4, 2102 BA Heemstede.

beiden vanaf 1.X.1989: Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Kemperbergerweg 67/Postbus 9201, 6800 HB Arnhem.

Mededeling no. 1. van het Atlasproject.

Dankzij een subsidie aan de vereniging van het Ministerie van Landbouw en Visserij, kan dit jaar worden gestart met het project 'voorlopige verspreidingsatlas van macrofungi in Nederland'. Het is de bedoeling dat er in 5 jaar tijd verspreidingskaartjes met bijbehorende teksten

worden gepubliceerd van zo'n 400 soorten. De oecologie, verspreiding in Nederland, vergelijking met verspreidingsgegevens van het buitenland zijn enkele onderwerpen die in de teksten aan de orde zullen komen. De nadruk zal liggen op patroonherkenning en oorzaken van de voorkomende verspreidingspatronen. Ook zal aandacht besteed worden aan veranderingen in het voorkomen vroeger en nu.

Verschillende typen soorten zijn voor de atlas geselecteerd:

- soorten die (vermoedelijk) bedreigd worden, sterk achteruitgaan, of altijd al zeldzaam geweest zijn (b.v. ectomycorrhizasoorten van de geslachten *Hygrophorus* en *Tricholoma*).
- soorten die een hoge indicatiewaarde hebben voor verzuring en bemesting van het milieu.
- de soorten moeten redelijk eenvoudig te herkennen zijn; goede bewerkingen of sleutels moeten beschikbaar zijn.
- niet alleen zeldzame soorten maar ook algemene soorten, algemeen in het gehele land of in een deel van het land (b.v. *Rickenella fibula*, *Marasmius oreades*).

In tabel 1 staat de volledige lijst waarvan uitgegaan wordt. Het is heel wel mogelijk dat er in de loop der tijd enkele kleine veranderingen zullen optreden, omdat er van bepaalde soorten b.v. haast geen gegevens voorhanden zijn. De soorten die met een ster zijn aangeduid zijn de zogeheten startsoorten, waaraan in 1989/1990 gewerkt zal worden.

Het is iedereen natuurlijk bekend, dat nog lang niet van geheel Nederland karteringsgegevens bekend zijn (zie fig. 1), om nog maar niet te spreken van volledigheid van de gegevens voor wat betreft de oecologie. Ons atlasproject staat of valt met de kwaliteit en de kwantiteit van de beschikbare gegevens. En de gegevensleveranciers zijn alle leden van de N.M.V.! We willen U allen dan ook vriendelijk doch dringend verzoeken door te gaan met het invullen van de bekende formulieren (te verkrijgen bij Lies Jansen, RIN, Arnhem). Niet alleen dus nieuwe gebieden inventariseren, maar ook de terreinen die U al jaren bezoekt, of jaren geleden eens bezocht heeft, weer te onderzoeken, omdat zo ook verschillen, voor- en achteruitgang, geconstateerd kunnen worden. Ook eens (iets meer) aandacht voor landschaps- en vegetatietype, substraat en organisme, ook bij heel gewone soorten, is zeer welkom. Van twee bekende soorten zijn verspreidingskaartjes opgenomen, (fig. 2 en 3), zodat U een indruk krijgt hoeveel gegevens er nu zijn van deze paddestoeltjes.

We hopen in de toekomst in Coolia af en toe aandacht te schenken aan de te behandelen soorten, hoe ze te herkennen en witte plekken excursies te organiseren.

De kaartjes die hier worden afgedrukt zijn vervaardigd door het B.I.C., op grond van geleverde gegevens door de N.M.V. Op maandag, dinsdag en woensdag zijn we in Arnhem, waar U altijd terecht kunt met vragen en opmerkingen. Het telefoonnr. is 085-452991; het adres staat bovenaan.

Tabel 1. De geselecteerde soorten die in de verspreidingsatlas behandeld zullen worden. Een * geeft een startsoort aan. Nomenclatuur volgens de Standaardlijst.

Amanita (*A. citrina, *A. fulva, *A. phalloides); *Anellaria; Asterophora; Astracus; Auriscalpium
 Bankera; Boletinus; Boletus (*B. erythropus)
 Camarophyllus; *Cantharellus; *Chalciporus; Chroogomphus; Clitopilus prunulus; Collybia; *Coltricia; Cordy-
 ceps canadensis, C. capitata en C. ophioglossoides; Craterellus
 Daldinia; Discina
 Elaphomyces; Ganoderma (*G. applanatum); Geastrum; Geoglossum; Gomphidius; Grifola; Gyrodon; Gyro-
 mitra; Gyroporus
 *Hericium; *Heterobasidion; Hirneola auricula-judae; Hydnullum; Hydnum; Hygrocybe; Hygrophoropsis; Hy-
 grophorus; Hygrotrama; Hypholoma capnoides, H. fasciculare, H. sublateralitum
 *Inocybe asterospora, *I. atripes, *I. bongardii, *I. calamistrata, *I. corydalina, *I. fastigiata, *I. geophylla, *I.
 jurana, *I. lacera, *I. lanuginella, *I. maculata, *I. napipes, *I. patouillardii, *I. pyriodora, *I. sambucina, *I.
 squarrosa.
 *Kuehneromyces
 *Laccaria amethystea; *Lactarius chrysorrheus, *L. necator, *L. rufus, *L. vellereus s.l., *L. vietus; Laetiporus;
 Langermannia; Lenzites; Leotia
 Macrolepiota; Marasmiellus; Marasmius androsaceus, M. oreades, M. prasiosmus, M. rotula, M. scorodoni-
 us; Melanophyllum; Meripilus; Microglossum; Micromphale; Mitrophora; Mitrula; *Morchella; Mutinus; Mycena
 adonis, M. belliae, M. epipterygia, M. galericulata, M. galopus, M. haematopus, M. leptoccephala, M. megaspora,
 M. pearsoniana, M. pelianthina, M. pura, M. sanguinolenta, M. seynii; *Myriostoma; Myxomphalia
 Omphalotus; Osmoporus; Oudemansiella
 Paxillus; Phaeolepiota; *Phaeolus; *Phallus; Phellodon; Phylloporus; Polyporus; *Poronia; Pseudocraterellus;
 *Pseudohydnum; Psilocybe callosa, P. cyanescens, P. liniformans, P. semilanceata; Pycnoporus cinnabarinus
 Rhizina; *Rickenella; Rozites caperatus; *Russula felca, *R. nigricans, *R. sardon-
 ia
 Sarcodon; *Schizophyllum; Sparassis; Squamanita; Strobilomyces; Suillus (*S. luteus)
 *Thelephora caryophyllea, *Th. palmata, *Th. terrestris; Thuemenidium; Trichoglossum; Tricholoma (*T. flavo-
 brunneum, *T. sulphureum); Tulostoma; Tylopilus
 Verpa; Volvariella
 *Xerocomus parasiticus; Xylaria




fig. 1. Aantal gemelde soorten per uurhok.




fig. 2. Verspreiding van *Rickenella fibula* in Nederland.




fig. 3. Verspreiding van *Rickenella setipes* in Nederland.