

BIJZONDERE WAARNEMINGEN EN VONDSTEN

Samengesteld door Machiel E. Noordeloos

Hok 22-23 en 22-24

Geïnspireerd door het kaartje in de vorige Coolia waar de witte plekken van Nederland op ingetekend waren, besloot ik na de regenval van begin juli eens een paar onbekende uurhokken in noordoost Overijssel te bezoeken. Met de fiets vanuit Zuidwolde ging ik richting Slagharen. De wetenschap door een witte vlek op de kaart te rijden, maakte dat ik het op zich tamelijk saaie landschap met andere ogen ging bekijken. Dat is zo wie zo het genoeg van een Mushroom-safari: Nederland wordt er weer spannend door. Dit Columbusgevoel werd langzaam aangetast door de eentonigheid van maisakkers en weilanden. Uurhok 22-23 is geen parel in het Nederlandse landschap. De afwisseling kwam vooralsnog van de voor mij wonderlijke namen van geuchten als Braamberg, Witman en Schuinesloot. Maar nadat ik de hoop al bijna had opgegeven meer te vinden dan *Psathyrella candolleana* en *Collybia dryophila*, passeerde ik na het laatstgenoemde dorp een schrale berm in de schaduw van wat bosjes. Een oase met veel *Helvella lacunosa* en verder o.a. *Russula odorata*, *R. pectinatoides* en *Agaricus silvicola*. Totaal bijna 20 soorten in een berm van honderd meter.

Nog leuker was een Essenbosje een kilometer verderop in uurhok 22-24. Onder enkele Paardekastanjes temidden van Populieren en Essen vond ik, groeiend op overjarige bolsters, veel exemplaren van een *Coprinus* die ik thuis als *Coprinus flocculosus* determineerde. Op dezelfde plek stonden tussen de dorre bladeren ruim 30 exemplaren van een prachtige *Entoloma* met donker roodbruine fibrilleuze hoedjes: *Entoloma scabiosum*. Ook *Polyporus badius* en *Clitocybe houghtonii* waren aardige vondsten. Totaal zo'n dertig soorten. Weer 2 witte uurhokken minder!

Rob Chrispijn, Vledderveen

Disciseda bovista: een tweede vindplaats in de duinen van Meyendel

Dit voorjaar leidden wij een excursie naar Kijfhoek en Bierlap, een mooi duingebied ten noorden van Den Haag. Het was vrij droog geweest in de periode voor 12 mei en er waren dan ook weinig deelnemers en paddestoelen. Een aantal typische duinfungi waren er wel, met name Gasteromyceten. We waren net op zoek naar *Geastrum recolligens* die een aantal malen op een open plek bij een rode bosmierennest in het Bierlapbos werd gevonden, toen iemand een andere Gasteromycete opraapte. Het bleek de tweede recente vondst van *Disciseda bovista* in dit duingebied te zijn. In Coolia 32(3) (1989) werd een vondst besproken, van een plaats niet ver van dit gebied. Ook hier gaat het om een open plek met enigszins rommelige begroeiing, en vlak naast een paadje. Deze soort is tot nu toe alleen bekend uit de duinen van Meyendel.

Marijke Nauta & Leo Jalink, Leiden