

BIJZONDERE WAARNEMINGEN EN VONDSTEN

Vreemd gaan

Tijdens de laatste binnenlandse werkweek in de Achterhoek, vonden Herman Sieben en ik een forse witte paddestoel, die aan de voet van een spar tegen de stam groeide. Het bleek *Pleurotus dryinus* (Schubbige oesterzwam) te zijn, die gewoonlijk alleen op loofhout voorkomt. Het exemplaar was centraal gesteeld en vertoonde een geelverkleuring die wat sterker leek dan normaal. Daarom hebben we hem gedroogd en gedeponerd in het herbarium van het Biologisch Station te Wijster. Je weet maar nooit!

Dat houtpaddestoelen hun substraat wel vaker ontrouw zijn, bleek diezelfde week toen Else Vellinga op een excursie in het Bos van de Boskapel de Denneschelpzwam (*Panellus mitis*) op berkeschors vond. Ook in de maand daarna vielen er opvallend veel gevallen van vreemd gaan te signaleren, zoals blijkt uit onderstaand lijstje:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 9 nov. ten Z. van Nunspeet | km.hok 182/483 - <i>Schizophyllum commune</i> op dennetak |
| 11 nov. Berkenheuvel (Diever) | km.hok 216/542 - <i>Pleurotus ostreatus</i> s.l. op sparrestam |
| 25 nov. ten O. van Ermelo | km.hok 174/480 - <i>Pleurotus ostreatus</i> s.l. op dennetak |
| 3 dec. ten N. van Epe | km.hok 196/487 - <i>Schizopora paradoxa</i> op sparretak |
| 5 dec. Klimberg (Hardenberg) | km.hok 233/510 - <i>Pleurotus ostreatus</i> s.l. en <i>Panellus serotinus</i> op dennestam, samen met <i>Panellus mitis</i> ! |

Volgens Jülich (1984) komt *Schizopora paradoxa* wel vaker op naaldhout voor, en Breitenbach & Kränzlin (1986) vermelden Zilver spar als organisme, van de andere soorten wist ik niet dat ze ook op naaldhout kunnen voorkomen. Opvallend is dat het vooral loofhoutsoorten zijn, die zich vergrijpen aan naaldhout, waarbij het de vraag is of te maken hebben met een toevallig verschijnsel of het begin van een trend.

Interessant in dit verband is een opmerking van Mirjam Veerkamp (1992) in het rapport over mycologisch onderzoek in bosreservaten. Ze signaleert hierin de veranderingen die plaatsvinden in de mycorrhizaflora van naaldbos. Vooral in naaldbossen met een dikke strooisellaag blijken tegenwoordig soorten voor te komen, die vroeger alleen bij loofbomen groeiden.

Rob Chrispijn, Vledderveen

LITERATUUR

- Breitenbach, J. & F. Kränzlin, 1986. Pilze der Schweiz. Band 2. Nichtblätterpilze. Luzern.
 Jülich, W., 1984. Die Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. In H. Gams, Kleine Kryptogamenflora IIB/1.
 Veerkamp, M.T., 1992. Paddestoelen in bosreservaten. Hinkeloord Reports 4.