

Andere soorten

Binnen de Taalingen is nog een aantal soorten met een collarium. Het Dwergwielkje, *Marasmius bulliardii*, is kleiner dan het Wielkje, en de hoed is bruiner. Het groeit in groepjes op afgevallen blad, vooral van Eik en Beuk in loofbossen. Het Rietwielkje, *Marasmius limosus*, is wittig, maar veel kleiner dan het Wielkje, en groeit op allerlei grassen en grasachtigen op moerassige plaatsen. Door de geringe afmetingen, en het feit dat de paddestoeltjes heel snel indrogen en dan bijna niet meer terug te vinden zijn, is het Rietwielkje voor velen een onbekende. Het is echter een wijd verspreide soort in Nederland. Ga er maar eens naar op zoek!

Literatuur

In Nederland komt nog een twintigtal andere soorten Taalingen voor. Een aantal jaren geleden is al eens een determineersleutel voor Nederland gepubliceerd (Jansen & Noordeloos, 1980). Er zijn intussen wat soorten bijgekomen, en namen veranderd. Maar in het derde deel van de Flora agaricina neerlandica (Bas & al., in prep.) dat binnenkort uitkomt, kun je de allernieuwste gegevens over Taalingen vinden, alsmede in de Europese monografie van Antonín & Noordeloos (1993).

LITERATUUR


- Antonín, V. & M.E. Noordeloos, 1993. A monograph of *Marasmius*, *Collybia* and related genera in Europe, vol. 1. *Marasmius*, *Setulipes* & *Marasmiellus*. Libri botanici, vol. 8.
- Bas, C., Th.W. Kuyper, M.E. Noordeloos & E.C. Vellinga (eds), (in prep.). Flora agaricina neerlandica, vol. 3. Tricholomataceae, pars. 2. Rotterdam, Brookfield.
- Huijsman, H.S.C., 1971. Over reviviscentie bij Agaricales. *Coolia* 15: 35-40.
- Jansen, A.E. & M.E. Noordeloos, 1980. Sleutel tot de soorten van de genera *Marasmius*, *Collybia*, *Marasmiellus*, *Micromphale* en *Crinipellis* in Nederland, aangrenzend België en west Duitsland. *Coolia* 23: 2-9.
- Nauta, M., 1992. Begin eens met het Fluweelpootje. *Coolia* 35: 25-27.

Coolia 36: 31 - 32. 1993

BIJZONDERE WAARNEMINGEN EN VONDSTEN

Alweer het Mestnestzwammetje

Begin november kregen wij een telefoontje van Eddy Weeda, die ons uitnodigde om hem te vergezellen op een excursie door de zeeleep ten zuiden van Zandvoort. Nu is zo'n uitnodiging van de Nederlandse goeroe van de plantenoeologie geen reden tot ijdelheid en al helemaal niet tot ledigheid aangezien het meestal ontaardt in een forse hoeveelheid nadetermineerwerk. Eddy verzamelt en zijn mycologische slaven werken uit.



Dwarsdoorsnede vruchtlichaam mestnestzwammetje: a. grashalm; b. spits toelopende voet van de beker, die als een soort penwortel tussen de buitenste bladschede en de stengel zit; c. roestkleurige, wollige myceliummassa; d. peridiole

het bekertje een dichte, roestkleurige, wollige massa van myceliumdraden te zien die een klont zand van ongeveer een centimeter in doorsnede vasthoudt. Enkele exemplaren waren niet (zichtbaar) verbonden met het gras en deze hadden een soortgelijke myceliumklont aan de basis. Geen enkel exemplaar had ook maar enige binding met konijnkeutels, hoewel die wel voorhanden waren.

Leo Jalink en Marijke Nauta

Okerknolcollybia op Ruige weerschijnzwam

Op een avond in oktober gaat de voordeurbel van onze residence te Oegstgeest. Hoe later op de avond, hoe beter het volk, blijkt weer van toepassing. Het is Jan van der Veer met, u raadt het al, vers materiaal van een paddestoeltje. In zijn handen heeft hij een grote zwarte, doorweekte plak, naar zijn zeggen een oud exemplaar van de Ruige weerschijnzwam *Inonotus hispidus*. Erop groeien een aantal kleine paddestoeltjes die veel doen denken aan de paddestoelbewonende soorten van *Collybia*. En dat blijkt ook het geval. Na enig zoeken worden de bekende gele knolletjes van de Okerknolcollybia *Collybia cookei* ontdekt. Wij hadden deze soort nog nooit op een houtzwam gezien. De plak hebben we later in onze tuin gelegd en daardoor hebben we een maand lang kunnen genieten van steeds verse *Collybia*atjes.

Leo Jalink en Marijke Nauta

Toch werd het weer een heel genoeglijke ochtend met koud maar zonnig weer. Naast Eddy en ondergetekenden waren ook Else Vellinga en John Lenny van de partij.

Op de basis van de bladscheuten van helmpollen werd weer een aantal malen *Campanella caesia* gevonden. Op verzoek van Leo werd er uitgekeken naar het Mestnestzwammetje *Cyathus stercoreus*, dat zoals bekend in Nederland tot nog toe uitsluitend in de buitenste zeeduin is gevonden. Het was Marijke die na een uurtje een zeer rijke vindplaats met vele tientallen exemplaren ontdekte.

Het Mestnestzwammetje groeide op een ijl begroeid karrespoor in de zeereep. De begroeiing bestond voornamelijk uit Duinzwenkgras, *Festuca rubra* subsp. *arenaria*. De meeste vruchtlichamen stonden dicht tegen de halmen van het Duinzwenkgras aangedrukt. Een aantal plaggen werd mee naar huis genomen om nog eens goed naar de aanhechting te kijken. Zeer vaak bleken de nestzwammetjes met hun bijna penwortelachtig uitlopende basis op de buitenste, verdroogde bladscheden van het zwenkgras geënt (zie tekening). Aan de van het gras afgekeerde zijde is aan de basis van