

LITERATUUR

- Bas, C., Th.W. Kuyper, M.E. Noordeloos & E.C. Vellinga, 1988. Flora agaricina neerlandica. 1. Rotterdam, Brookfield.
- Kühner, R. & H. Romagnesi, 1953. Flore analytique des champignons supérieurs. Paris.
- Moser, M., 1983. Die Röhrlinge und Blätterpilze. 5. Aufl. In H. Gams, Kleine Kryptogamenflora. Band IIb/2.
- Noordeloos, M.E., 1987. *Entoloma* (Agaricales) in Europe. Synopsis and keys to all species and a monograph of the subgenera *Trichopilus*, *Inocephalus*, *Alboleptonia*, *Leptonia*, *Paraleptonia*, and *Omphaliopsis*. Beih. Nova Hedwigia 91.
- Noordeloos, M.E., 1992. *Entoloma* s.l. Fungi Europaei 5. Giovanna Biella, Saronno.
- Noordeloos, M.E. & A. Hausknecht, 1993. Die Gattung *Entoloma* in Ostösterreich. Öst. Z. Pilzk. 2: 45-96.
- Wölfel, G., 1989. Was ist *Leptonia flocculosa* Bres.? Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleuropas V: 51-54.

Coolia 38: 135. 1995

BIJZONDERE WAARNEMINGEN EN VONDSTEN

Warme zomer brengt subtropische *Conocybe*

Eind juli en begin augustus 1994 beleefde ons land een hittegolf. In Helmond en omstreken werden temperaturen van 36° C. gemeten. Op een plek in mijn achtertuin had ik tegen een muur zilverzand gemengd met kippemest gedeponeerd. Daarop verschenen na enige tijd paddestoelen met een *Hebeloma*-achtig uiterlijk. Microscopisch onderzoek leverde echter voor dit geslacht totaal afwijkende kenmerken op, en wel geknopte cheiloen caulocystiden. Bovendien bleken de sporen glad te zijn en voorzien van een kiempore. Hierdoor werd de mogelijkheid van *Hebeloma* geheel uitgesloten. Al zoekende naar een passende naam herinnerde ik me dat sommige *Conocybe*-soorten zulke cystiden bezitten. Maar de vruchtlichamen lijken in de verste verte niet op een *Conocybe*. Uiteindelijk vond ik in de sectie *Gigantae* een soort welke geheel aan mijn vondst voldeed. Het bleek *Conocybe intrusa* (Peck) Sing. te zijn. Deze voor mij heel merkwaardige soort heeft volgens de literatuur haar hoofdverspreiding in de subtropen. Volgens de Standaardlijst is deze soort alleen uit kassen bekend. Wellicht is het extreem warme weer er de oorzaak van dat deze soort nu ook buiten kassen werd waargenomen.

Henk Lammers, Helmond