

Groningen	R.A.F. Sullock-Enzlin, Timorstraat 30a, 9715 LG Groningen.
Friesland	S. Greydanus, Nye Streek 11, 9223 NC Houtigehage.
Drenthe	(Centr. Coörd.) B. de Vries, Biologisch Station, Kampsweg 27, 9418 PD Wijster.
Overijssel	W. Ligterink, Pr.W. Alexanderlaan 46, 7462 EV Rijssen.
Gelderland + N.punt Limb.	E. Brouwer, Fleminghstraat 73, 6532 XC Nijmegen.
Noord-Holland	M. Groenendaal, de Ruyterstraat 91, 1792 AM Oudeschild.
Flevoland	G. v. Zanen, de Breekstraat 36, 1024 LJ Nieuwendam.
Utrecht	E. v.d. Dool, Achter Clarenburg 2, 3511 JJ Utrecht.
Zuid-Holland	M. Nauta, J. Vermeerlaan 33, 2343 CT Oegstgeest.
Rijnmond	A.P. v.d. Berg, Merellaan 192, 2902 JK Capelle a/d IJssel.
Zeeland	W. Kuys, Bongerd 58, 4462 TC Goes.
Noord-Brabant	F. Benjaminsen, Mullerweg 23, 5624 JC Eindhoven.
De Peel	nog in beraad.
Zuid-Limburg	nog in beraad.

Hoe een en ander zal functioneren moeten we uitproberen. Aan het einde van dit jaar hopen we een evaluatie te houden en, waar nodig, de organisatie bij te sturen.

Het is de bedoeling dat het werk van de centrale coördinator beperkt wordt tot foutencorrectie, gegevensinvoer, gedeeltelijk bestandsbeheer en verzorgen van gegevensuitdraai voor diverse personen en instellingen. Al deze werkzaamheden uit te voeren in één dag per week. We hopen daarvoor geld te krijgen van het Ministerie van LNV.

Op deze manier moet het mogelijk zijn om, met steun van het ministerie, de opbouw van, en de communicatie met onze databank op een verantwoorde manier in stand te houden.

U ziet dat er meer werk afhankelijk wordt van vrijwilligers. Meer nog dan voorheen is het noodzakelijk dat we hen zo veel mogelijk proberen tegemoet te komen, onder andere met correct ingevulde formulieren. We verwachten dat er een stimulans uit zal gaan van zelfstandiger werkende districten.

Bernhard de Vries

NMV-WEEKEND OP VLIELAND 21-23 OKTOBER 1994

Alhoewel het al bijna twee jaar geleden is dat ons jaarlijks weekend op Vlieland gehouden werd, toch nog een kort verslag nu alle gegevens beschikbaar zijn.

De belangstelling was verheugend groot, 23 personen namen deel. Het Donia-huis bleek een prima onderkomen te zijn met een grote kamer waarin voldoende ruimte om te werken, te eten en gezellig te borrelen. De keuken bood ruime mogelijkheid voor het bereiden van maaltijden, de door de mannen gebakken pannekoeken op zaterdagavond waren dan ook een groot succes.

De meeste deelnemers kwamen op vrijdag met de vroege boot naar het eiland,

zodat op vrijdagmiddag de eerste excursie gehouden werd. Door de droge voorafgaande periode waren de verwachtingen niet groot, maar het bos langs de Lange Baan, beplant met voornamelijk naaldbomen, waaronder plaatselijk mooie korstmostapijen, leverde toch enkele typerende soorten op, o.a. veel exemplaren van *Amanita gemmata* (Narcisamaniet), *Suillus bovinus* (Koeieboleet), *S. variegatus* (Fijnschubbige boleet), *Tricholoma albobrunneum* (Witbruine ridderzwam), *T. equestre* (Gele ridderzwam) en de zeer zeldzame *Botryohypochnus isabellinus* (Stekelsporig trosvlies).

In het aangrenzende open duingebied en een weiland dat begraasd wordt en begroeid is met o.a. *Salix repens* (Kruipwilg), werden de volgende bijzonderheden gevonden. De zeer zeldzame *Cheilymenia raripila* (Blond borstelbekertje), *Cortinarius cohabitans* (Kousevoetgordijnzwam), *C. croceoconus* (Boomloze gordijnzwam) en *C. uliginosus* f. *uliginosus* (Kopperode gordijnzwam). En voor de meeste deelnemers zijn soorten als *Gastrum schmidlii* (Heideaardster), *Geoglossum cookeianum* (Brede aardtong), *G. glutinosum* (Kleverige aardtong) en *Omphalina acerosa* (Schelprechttertje) geen alledaagse soorten.

Zaterdagochtend huurden we allemaal een fiets en togen naar de Kroon's Polders, waar we eerst met z'n allen spiedend, ruikend en snuivend de schrale graslanden langs de Polderweg inventariseerden. Wij vonden daar 13 soorten wasplaten. Dankzij Henk Huijser konden er al een groot aantal op naam gebracht worden. Op de lijst staan o.a. de zeer zeldzame *Camarophyllopsis micacea* (Okersteelwasplaat), *Hygrocybe calciphila* (Kalkvuurzwammetje), *H. luteolaeta* (Verblekende wasplaat), *H. phaeococcinea* (Karmozijnwasplaat) (dit is de typelocatie van deze soort) en *H. russococcinea* (Geurende wasplaat). De daar aanwezige rietvelden leverden *Mycena belliae* (Rietmycena) op, een mycena die saprotroof op overjarig riet groeit.

Na de "warming up" met koffie en gebak in het Posthuys splitste de groep zich op in kleinere groepjes, waardoor op die dag in totaal 13 karteringslijsten ingevuld werden. Op de lijsten treft men ondermeer aan: *Mycena seynii* (Zeedenmycena) op kegels van Zeeden, *Melanoleuca cinereifolia* (Duinveldridderzwam) en *Phallus hadriani* (Duinstinkzwam) die in de buitenste duinen groeien.

De meest fanatieke excursiegangers werden verrast door een stortbui en kwamen zo drijfnat aan. 's Avonds werd er druk gebruik gemaakt van de meegebrachte microscopen. Alle gevonden wasplaten kwamen ter tafel, waarna Henk Huijser een uiteenzetting gaf over de indeling en verschillen van de soorten onderling.

Zondag werd de oostkant van het eiland bezocht. Het Doniabos leverde uiteindelijk de lijst met de meeste soorten op (80). Soorten die we nog niet eerder

zagen waren o.a. *Cortinarius bolaris* (Roodschubbige gordijnzwam) en *C. fulvescens* ss. Favre, volgens de nieuwe Standaardlijst een soort die niet eerder in het bestand van de NMV opgenomen is. Het vraagteken achter het ééntje op pagina 774 van het "Overzicht" wordt dus een uitroepteken! In het Bos bij Oost werd de vrij zeldzame *Inocybe whitei* (Blozende dennevezelkop) gevonden. Op het grasland "Oostervallei" stonden naast een aantal wasplaten nog twee kenmerkende soorten voor dit type terreinen, nl. *Clavulinopsis helveola* (Gele knotszwam) en *C. luteoalba* (Verblekende knotszwam).

Om ongeveer drie uur werd de excursie beëindigd, waarna we na wat poetswerk in het Doniahuis met de boot van kwart voor vijf weer naar het vasteland terugkeerden.

Mocht u ook eens (of weer) een dergelijk weekend mee willen maken, schrijf dan in voor het weekend op Terschelling. Voor informatie zie het excursieprogramma in dit nummer.

Elisabeth Jansen, Goudenregenlaan 8, 6862 WT Oosterbeek

DE POPULIERMELKZWAM, *LACTARIUS CONTROVERSUS*, IN FLEVO-LAND

Met de inrichting van de polders en de aanplant van de bossen zijn veel populieren aangeplant. In de Noordoostpolder ging het vooral om *Populus x canadensis*, de bastaard tussen de inlandse Zwarte populier, *P. nigra* en een Amerikaanse soort, nl. *P. deltoides*. Aanplant vond in de Noordoostpolder vooral plaats langs wegen en binnen Voorster- en Urkerbos ook als opstanden. In O.-Flevoland nam de aanplant in bosverband een grote vlucht. Het Roggebotzand was het eerste polderbos waar de populier op grote schaal in de praktijk is aangeplant (Groenhuis, 1983). In alle bossen in deze polder komt een hoog percentage populier voor, vooral van *P. x canadensis*. In Z.-Flevoland zien we dezelfde trend; alleen is hier ook op grote schaal overgegaan op aanplant van balsempopulieren (*P. trichocarpa*), die veel donkerder opstanden vormen dan de vaak ruige opstanden van de Canadapopulier. In de volgorde van de leeftijd van de polders zien we het aandeel van Canadapopulieren in de wegbeplanting dalen.

De Canadapopulier is dus een algemene soort in de Flevopolders, vooral op de lutumhoudende gronden. Toch heeft deze soort nooit bekend gestaan om het grote aandeel mycorrhiza-soorten. Frans Tjallingii schreef dan ook in één van de eerste berichten in 1977: 'Gezien de enorme oppervlakte die populierbossen in de polders beslaan, behoeft het niet te verwonderen dat er verscheidene populierbegeleiders