

NIEUWSBRIEF WERKGROEP PADDESTOELENKARTERING STAND VAN ZAKEN 1998

Onverstoord gaat de kartering door. Er zit nog steeds groei in het hele gebeuren. We zitten nu, 15 mei, op 908.358 waarnemingen, we zijn dus mooi op weg naar het miljoen. Ook nu nog worden waarnemingen uit voorbije jaren aan het bestand toegevoegd; om die reden (een getal dat niet meer verandert) ging ik in vorige jaren uit van het jaar waarin de gegevens werden verwerkt. Voor de volledigheid geef ik deze keer enkele getallen die gebaseerd zijn op het jaar van waarneming (Tabel 1). Bij het getal onder 1997 moet u denken aan het weer dat ons parten speelde.

Tabel 1. Aantallen waarnemingen x 1000 per jaar gebaseerd op vondstdata.

jaar:	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
waarn.:	37	49	54	55	67	61	62	49	59	30


Met het aantal coördinatoren is ook het aantal waarnemers sterk toegenomen; het totaal staat nu op 316. In 1997 kwamen er 25 beginnende karteerders bij. Dat is de oogst van lokale voorlichting en begeleiding. Langzaam vindt er vervanging plaats van waarnemers die er mee gestopt zijn en van hen die helaas zijn overleden. Het aantal actieve karteerders schommelt het laatste decennium jaarlijks tussen de 100 en 140. Ik denk dat het laatste jaar wat dat betreft vrij hoog zal scoren.

Er zijn verder na het verschijnen van het "Overzicht" 205 soorten bijgekomen. Het einde van deze groeiende reeks is nog lang niet in zicht. De districtscoördinatoren ontvangen regelmatig een "update" en als u ook zo'n (voorlopige) lijst wilt hebben dan is één telefoontje genoeg. Denkt u er wel om: als u een soort nieuw voor Nederland vindt, dan moet daar een bewijscollectie bij die gecontroleerd is door iemand die goed thuis is in de betreffende paddestoelengroep.

Er zijn nu, inclusief de restgroepen, ongeveer 4110 soorten opgenomen in het karteringsbestand en er wordt gewerkt aan het invoeren van een groep, 240 soorten, meest ascomyceten, die bij het Centraal Bureau Schimmelcultures te Baarn aanwezig is. Bovendien is er een hele serie nieuwe Mosschijfjes gevonden door E. Brouwer.

Van onze "macromyceten" komt 16% slechts voor in één uurhok en 42% komt voor in minder dan 7 uurhokken. Ongeveer de helft van alle gekarteerde soorten is dus zeldzaam of weinig gemeld. Daar tegenover staat dat van onze waarnemingen 18% wordt ingenomen door meldingen van 23 zeer algemene soorten (> 5000 meldingen per soort).

Bij bewerking van karteringsgegevens ontdekken we steeds meer hoe belangrijk de oecocodes zijn. U bent niet verplicht om habitat, substraat en organisme in te vullen maar als het enigszins mogelijk is zou het fijn zijn als u het wel doet. Naast extra informatie geeft het ons ook mogelijkheden voor controle. Als u bijvoorbeeld per ongeluk *Lachnum sulphurellum* (Gagelfranjekelkje) in plaats van *Trichopeziza sulphurea* (Zwavelgeel franjekelkje) invult en bij organisme "brandnetel" dan weten we vrijwel zeker dat U zich vergist



Figuur 1. Aantal gevonden soorten fungi per uurhok (mei 1998).

heeft. Deze vergissing komt veel voor!!

Een ander soort vergissing wordt ook talrijker: er zijn mensen die denken dat bijvoorbeeld een Franjekelkje of een *Mollisia* met uitsluitend een plaatje en zonder microscoop te determineren is. 't Is voor u misschien tragisch, maar het kan niet! Lees voor het determineren altijd de inleiding bij de genera in het "Overzicht".

Het volgende idee verdient zeker navolging: Plaats achter elke soort die microscopisch gecontroleerd is het teken "M!" naast de kantlijn (niet in de hokjes!). Dit vergemakkelijkt de controle door de districtscoördinator en geeft bij latere raadpleging van het archief duidelijkheid. Ook in het nieuwe invoerprogramma en in ons gegevensbestand is daar ruimte voor gemaakt. Tevens willen we terreinnamen daarin gaan opnemen. Als u die invult hebben we graag de namen uit de "Grote Topografische Atlas".

We hopen dat dit jaar nog het nieuwe invoerprogramma voor verspreiding geschikt is. Dan kan het invoeren van gegevens niet alleen gemakkelijker voor u, maar ook vele malen goedkoper en sneller. Het zal ook betekenen dat voor de districtscoördinatoren meer tijd vrij komt voor de begeleiding van karteerders. Daarnaast krijgen de districtscoördinatoren ook de beschikking over de gegevens in hun gebied; tenminste voorzover daarvoor computerapparatuur aanwezig is (zie E. Jansen, deze Coolia, p. 142).

Vanaf de komende jaarwisseling zal de centrale coördinatie plaatsvinden vanaf mijn privé-adres. Op dinsdag, woensdag en donderdag hoop ik dan telefonisch bereikbaar te zijn. Vragen betreffende het karteringsarchief kosten dan wat meer tijd omdat de oude formulieren dan niet meer binnen handbereik staan. Ook de determinatie-hulp van E. Arnolds en Th. Kuyper is dan niet meer zo dichtbij. Ik reken wat dat betreft ook op hulp van onze specialisten. Het e-mail adres is straks: bwldevries@hetnet.nl. Het antwoordnummer komt dan te vervallen; dat werd toch al weinig gebruikt.

B.W.L. de Vries

UIT DE REGIO

met mededelingen van de districtscoördinatoren en verslagen van de NMV-excursies

Zoals boeren en buitenlui betaamt zijn wij afhankelijk van het weer. Dat bleek dit jaar overduidelijk. Landelijk gemiddeld viel er 648 mm neerslag tegen 792 mm normaal. De jaarsommen liepen sterk uiteen: Volkel ving 535 mm en De Bilt 744 mm. De verdeling over het jaar was voor ons niet gunstig; mei en juni waren nat terwijl augustus (hittegolf), september en november droog waren. Oktober begon warm, maar gaf toch normale neerslag; op 16 oktober was plaatselijk in het oosten de eerste vorstdag van het seizoen. De laatste week van oktober was zeer koud; november was droog en zacht. Alleen ter hoogte van Vlissingen ontving men in november een normale portie regen. De drie herfstmaanden waren zeer zonnig; 370 zonne-uren tegen 292 normaal (jaaroverzicht De Bilt).

In Limburg viel de eerste regen pas in juni en vervolgens moest men wachten tot oktober voordat enige regen van betekenis viel (meded. P. Kelderman). Door de korte