

heeft. Deze vergissing komt veel voor!!

Een ander soort vergissing wordt ook talrijker: er zijn mensen die denken dat bijvoorbeeld een Franjekelkje of een *Mollisia* met uitsluitend een plaatje en zonder microscoop te determineren is. 't Is voor u misschien tragisch, maar het kan niet! Lees voor het determineren altijd de inleiding bij de genera in het "Overzicht".

Het volgende idee verdient zeker navolging: Plaats achter elke soort die microscopisch gecontroleerd is het teken "M!" naast de kantlijn (niet in de hokjes!). Dit vergemakkelijkt de controle door de districtscoördinator en geeft bij latere raadpleging van het archief duidelijkheid. Ook in het nieuwe invoerprogramma en in ons gegevensbestand is daar ruimte voor gemaakt. Tevens willen we terreinnamen daarin gaan opnemen. Als u die invult hebben we graag de namen uit de "Grote Topografische Atlas".

We hopen dat dit jaar nog het nieuwe invoerprogramma voor verspreiding geschikt is. Dan kan het invoeren van gegevens niet alleen gemakkelijker voor u, maar ook vele malen goedkoper en sneller. Het zal ook betekenen dat voor de districtscoördinatoren meer tijd vrij komt voor de begeleiding van karteerders. Daarnaast krijgen de districtscoördinatoren ook de beschikking over de gegevens in hun gebied; tenminste voorzover daarvoor computerapparatuur aanwezig is (zie E. Jansen, deze Coolia, p. 142).

Vanaf de komende jaarwisseling zal de centrale coördinatie plaatsvinden vanaf mijn privé-adres. Op dinsdag, woensdag en donderdag hoop ik dan telefonisch bereikbaar te zijn. Vragen betreffende het karteringsarchief kosten dan wat meer tijd omdat de oude formulieren dan niet meer binnen handbereik staan. Ook de determinatie-hulp van E. Arnolds en Th. Kuyper is dan niet meer zo dichtbij. Ik reken wat dat betreft ook op hulp van onze specialisten. Het e-mail adres is straks: bwldevries@hetnet.nl. Het antwoordnummer komt dan te vervallen; dat werd toch al weinig gebruikt.

B.W.L. de Vries

UIT DE REGIO

met mededelingen van de districtscoördinatoren en verslagen van de NMV-excursies

Zoals boeren en buitenlui betaamt zijn wij afhankelijk van het weer. Dat bleek dit jaar overduidelijk. Landelijk gemiddeld viel er 648 mm neerslag tegen 792 mm normaal. De jaarsommen liepen sterk uiteen: Volkel ving 535 mm en De Bilt 744 mm. De verdeling over het jaar was voor ons niet gunstig; mei en juni waren nat terwijl augustus (hittegolf), september en november droog waren. Oktober begon warm, maar gaf toch normale neerslag; op 16 oktober was plaatselijk in het oosten de eerste vorstdag van het seizoen. De laatste week van oktober was zeer koud; november was droog en zacht. Alleen ter hoogte van Vlissingen ontving men in november een normale portie regen. De drie herfstmaanden waren zeer zonnig; 370 zonne-uren tegen 292 normaal (jaaroverzicht De Bilt).

In Limburg viel de eerste regen pas in juni en vervolgens moest men wachten tot oktober voordat enige regen van betekenis viel (meded. P. Kelderman). Door de korte

periodes in de herfst met koud weer ontstonden er in ons land grote mycologische verschillen.

In Drenthe was de mycoflora al in winterslaap toen in Zeeland, na de regen in november, de pret pas goed begon; daar, in Hulst, duurde het seizoen wel vier keer zo lang. Toch was daar de kans op vroege mycorrhizasoorten en champignons voorbij. Des te meer saprofieten sierden daar, met grote aantallen mooie vruchtlichamen, tot ver in de winter de bossen. In het grasland stonden daar op 4 december nog wasplaten en gele knotszwammen (meded. L. Noens).

Samenvattend was het seizoen toch voor velen niet wat men ervan verwachtte. Ook het totaal aantal waarnemingen bleef beneden het gemiddelde. Van enkele NMV-excursies zijn de gegevens verdwaald in de maalstroom der formulieren en dus niet hier vermeld. Als u duidelijk rechtsbovenaan "NMV-exc." schrijft dan kunnen we die in komende jaren gemakkelijker terugvinden. Veel excursies vielen uit of werden verplaatst naar "natter" oorden. Daar staat tegenover dat mensen die weinig verwachtten zich juist verwonderden over dat wat men ondanks het droge weer nog vond. Als grote paddestoelen ontbreken verzamelt men vaker "klein grut". Het aantal nieuwe (kleine) ascomyceten zegt wat dat betreft genoeg over "alternatief zoekgedrag".

B.W.L. de Vries

FRIESLAND (Sj. Greydanus). In Friesland is naast de Paddestoelenwerkgroep Friesland (PWF) sinds 1997 de KNNV-paddestoelenwerkgroep Drachten e.o. actief. Het aantal actieve karteerders breidt zich mede hierdoor geleidelijk uit. In 1997 hebben 19 (groepen van) waarnemers 386 formulieren ingeleverd. Het totaal aantal waarnemingen bedroeg 2745, van in totaal 519 taxa. Er zijn 195 kilometerhokken bezocht, verspreid over geheel Friesland. Alleen de noordwesthoek van Friesland blijft, wat het inventariseren betreft, nog steeds enigszins achter.

In 1997 heeft de PWF een excursie in de Stoekherne bij Hindeloopen gehouden. De schrale graslanden leverden vooral mestpaddestoelen op zoals *Cheilymenia granulata* (Oranje mestzwammetje), *Panaeolus acuminatus* (Spitse vlekplaat) en in grote getale *Panaeolus sphinctrinus* (Franjevlekplaat). In het Elzen/Wilgen-broekbosje werden ondermeer *Alnicola scolecina* (Donkere elzezompzwam) en *Stereum subtomentosum* (Waaierkorstzwam) aangetroffen.

In 1998 staat een ander grasland op het programma, namelijk het Hegewiersterfjild nabij Harlingen.

De KNNV-paddestoelenwerkgroep Drachten heeft zich in 1997 beziggehouden met de inventarisatie van de forten ten zuidwesten van Drachten. Langs de houtwallen die sterk onder druk staan van stikstofverrijking en verstoring werden enkele leuke vondsten gedaan zoals *Collybia ocior* (Donker eikebladzwammetje) en *Pluteus petasatus* (Zaagselhartzwam).

De paddestoelenwerkgroep zal zich voornamelijk richten op parken en plantsoenen in Drachten. Verder zal op verzoek van de beheerder waarschijnlijk de komende jaren het Reigerbos nabij Beetsterzwaag worden geïnventariseerd.

NMV-excursie Friesland

De Zwettepoel (25 oktober 1997; S. Greydanus). Er kwamen 8 deelnemers opdagen en met elkaar vonden we 69 soorten. De Zwettepoel bij Joure is een voormalige zandwinput, die door Staatsbosbeheer tot een recreatieterrein is gemaakt. Rondom de poel zijn bosjes van ondermeer Els, Berk en Eik aangeplant. De ondergroei van de bosjes wordt geleidelijk overwoekerd door Braam. Op de dikke strooisellaag met veel dood hout werden vooral strooisel- en houtsaprotieten aangetroffen. Enkele daarvan komen niet vaak op de Friese karteringslijsten voor, zoals *Daldinia concentrica* (Kogelhoutskoolzwam), *Datronia mollis* (Wijdporiekkurkzwam) en *Mycoacia uda* (Gele stekelkorstzwam). In het gebied bevinden zich hier en daar kleine grasperkjes. Op deze plekjes kwamen enkele leuke soorten voor zoals *Hygrocybe miniata* (Gewoon vuurzwammetje), *Clavulinopsis helveola* (Gele knotszwam) en *Calocybe carnea* (Roze pronkridder). Langs de dijk van het kanaal, de Oudeweg, werd bovendien *Hygrocybe psittacina* (Papegaaizwammetje) gevonden.

GRONINGEN (R. Sullock Enzlin). Vier jaren van intensief inventariseren in Groningen zitten er op. De grootste klus, het verwerken van de 41.000 gegevens en het schrijven van het verslag, ligt nu op ons te wachten. Van de 1600 taxa die in Groningen zijn aangetroffen is een selectie van 300 soorten gemaakt die besproken zullen worden.

Een tip van de sluier: Het Geweizwammetje is de meest algemene paddestoel in Groningen en komt in 113 van de 126 uurhokken voor. Ook het aantal waarnemingen is bij deze soort het hoogst, namelijk 675 maal opgegeven. Op kilometerhokbasis liggen de verhoudingen anders. We troffen het in 386 van de ± 1700 bezochte kilometerhokken aan (totaal kent Groningen zo'n 2500 kilometerhokken). Je komt het Geweizwammetje eigenlijk overal wel tegen, mits er maar oud en enigszins verweerd loofhout ligt. Jonge bosjes die je tegenwoordig overal vindt bleken een belangrijke groeiplaats te zijn. Een stronk, een stam en soms een tak is al voldoende.

Maar ook bijzonderheden komt men genoeg tegen; bijvoorbeeld op de Eemsvlakte een nieuw korstje: *Hypochnicium lundellii* (Bourd.) J. Erikss.; en op 15 november (!) in landgoed Ekenstein bij Appingedam: *Tricholoma album* (Witte ridderzwam), *Vararia gallica* (Grootsporig toverkorstje) en *Dendrothele acerina* (Esdoornpuzzelkorstje). Redenen genoeg om Groningen nog eens te bezoeken.


DRENTHE (B. de Vries). Vanuit Drenthe kwamen hoofdzakelijk formulieren van individuele excursies, of excursies georganiseerd door andere instanties. Soms brengt een uitnodiging in het blad van het Drents Landschap grote horden belangstellenden in actie; reden om in het vervolg niet meer alleen de leiding te nemen.

Naast onze natuurgebieden wordt ook steeds meer aan tuinen en parken gedacht. Een korte excursie, georganiseerd door Natuurmonumenten, bij Ruinen in een bungalowpark, leverde nog 77 soorten op, waaronder *Lyophyllum gangraenosum* (Blauw-vlekkende rouwridder).

Door gericht zoeken naar begraven dennekegels op een voorheen licht bekalkte plek, werd in boswachterij Dwingeloo op 4 november *Ascocorticiellum vermisporum* (Wormsporige zakjeswaaszwam) gevonden. Dit is tot nu toe de derde plek in Nederland.

Van oude herbariumgegevens uit onze provincie werd een deel, zeldzame soorten, ingevoerd. Daarbij zaten ook een paar nog niet goed bekeken collecties van *Xenolachne longicornis* Hauerslev. Dit is een phragmobasidiomycet die op *Cudoniella* parasiteert (Figuur 2). I. Antonissen en K.v.d. Put geven hiervan een goede beschrijving in Sterbeekia 16 (pagina 48 en 51). Met de loupe gezien lijkt deze soort op een imperfecte schimmel; vandaar misschien dat deze zo weinig bekend is. Beschrijving: vruchtlichaam dun; behaard. Sporen hyalien spoelvormig, $9,5-11,5 \times 3-3,4 \mu\text{m}$. Basidiën 2-delig, $7-9 \times 6-9 \mu\text{m}$. Epibasidiën stijf afstaand $25-37 \mu\text{m}$ lang. Hyfen met gespen, $2-5 \mu\text{m}$ breed.

Ook het komende seizoen zijn we, gezien de reorganisatiedrukke op het Biologisch Station, afhankelijk van individuele acties. Tussen alle bedrijvigheden door maken we plannen voor de jaren na dezen.



Figuur 2. *Xenolachne longicornis* Hauerslev. s= sporen, b=basidiën, h=hyfen, streepje=10 μm . Coll. M. Creveld 1771, Witteveen 27-09-1982. Op oude discomycet, op dode bast (binnenzijde) van Els.

NMV-excursie

Boekweitveentje (2 augustus 1997; H. Pras). Omdat in 1996 de excursie door droogte werd afgelast, bezocht ik enige dagen voor de excursie met lood in de schoenen en bezweet lijf wederom ons roemruchte paddestoelenparadijsje. Door de grote droogte vond ik niets dan enige triviale soorten, maar toch meer dan in 1996. Ik had niet het lef om de excursie opnieuw af te gelasten, maar toen enige lieden, die een lange reis moesten maken, mij belden, adviseerde ik hun om lekker thuis te blijven. Echter, een paar vochtige dagen en tien deskundige speurders brachten de oogst op 107 soorten. Enkele bijzondere vondsten zijn: *Inocybe amethystina* (Paarssteelvezelkop) die voornamelijk in Flevoland gevonden is, *Entoloma griseocyaneum* (Grijsblauwe satijnzwam) een soort van kalkhoudend zand of leem, en *Entoloma inusitatum* (Cystidesatijnzwam) die uiterst zeldzaam is. Met het schaamrood op de kaken bied ik de bellers mijn excuses aan.

OVERIJSSSEL (W. Ligterink). In Overijssel werd de NMV-werkweek gehouden van 4 tot 10 oktober vanuit Nieuw Heeten; we verwachten daarvan een verslag in de volgende Coolia.

Daarnaast kreeg ik uit de provincie van zes NMV-leden karteringslijsten toege-stuurd. Enkele interessante vondsten wil ik graag vermelden. S. Koning uit Hardenberg vond in de boswachterij van het Staatsbosbeheer ten zuidwesten van zijn woonplaats o.a. *Geastrum striatum* (Baretaardster), *Ganoderma lucidum* (Gesteelde lakzwam) en *Helvella acetabulum* (Bokaalkluifzwam). A. van den Berg vond in landgoed De Gelder bij Wijhe *Disciotis venosa* (Grote aderbekerzwam), *Ganoderma lucidum* (Gesteelde lakzwam), *Boletus fechtneri* (Bleke boleet), *Boletus appendiculatus* (Geelnetboleet), *Lactarius acerrimus* (Gekroesde melkzwam) en *Sclerotinia sclerotiorum* (Gewoon knolkelkje).

NMV-excursies

Hardenberg (11 oktober; B. de Vries). In de uitnodiging stond vermeld dat deze excursie vooral geschikt was voor beginners. Er kwamen 18 deelnemers op af en, om elkaar niet te zeer te belasten hebben we ons best gedaan geen moeilijke dingen te vinden. Toch kwam het aantal soorten, mede dankzij onze gids S. Koning en een uitstekende notuliste, op 114. Het was een prachtige wandeling en onze gids wist van geen ophouden. De soortenlijst bleef maar groeien. Leuke vondsten waren eigenlijk vooral de direct herkenbare gewone dingen, maar voor de gevorderden geef ik hier even wat minder algemene soorten: *Russula paludosa* (Appelrussula) in een stukje zandig dennenbos, *Tephrocybe palustris* (Veenmosgrauwkop) bij een vennetje, half onder een dennestam *Tyromyces ptychogaster*, inclusief het perfecte stadium, en *Amylostereum chailletii* (Sparrekorstzwam) op Douglasspar. In een verruigde berm vonden we een heldergeel Franjekelkje en uit ons blote hoofd schreven we op "*Lachnum sulphureum*". Dat ging dus mooi fout want de enige naam die daar op lijkt is die van *Lachnum sulphurellum* (Gagelfranjekelkje), en die houdt niet van brandnetels. Het moest dus *Trichopeziza sulphurea* (Zwavelgeel franjekelkje) zijn. En ik ben niet de enige die zich hiermee heeft vergist.

Diepenheim (18 oktober; W. Ligterink). Op 18 oktober werd een geslaagde NMV-excursie gehouden in de bossen bij Diepenheim (landgoed Het Nijenhuis). Het was schitterend herfstweer, zodat alleen al de wandeling in dit fraaie Twentse landschap de dag zeer de moeite deed zijn voor de mensen uit het verre westen. Als dan ook nog zeer bijzondere paddestoelen gevonden worden zoals *Sarcodon scabrosus* (Blauwvoetstekelzwam) en *Cortinarius glaucopus* (Schaeff. : Fr.) Fr. var. *glaucopus* (nieuw voor Nederland), dan is het geluk bijna volmaakt. Beide paddestoelen stonden in een beukenlaan. Andere mooie vondsten waren: *Pluteus luteus* (Bruinsnedehertezam), *Tricholoma ustale* (Beukenridderzwam), *Helvella latispora* (Witstelige zadelkluifzwam) en *Hydnum repandum* (Gele stekelzwam). Heel mooi waren ook de dichte bundels *Mycena inclinata* (Fraaisteelmycena) op dode houtstronken. Naar goed Twents gebruik werd de dag besloten met koffie en krentewegge op de deel van een oude Twentse boerderij. Het aantal deelnemers was 20, en er werden 168 soorten gevonden.

GELDERLAND (E. Brouwer). In Gelderland zijn grofweg drie soorten landschappen aanwezig voor paddestoelen: de hogere zandgronden (Gelders district) met als meest sprekende voorbeeld de Veluwe, het rivierengebied (fluvieel district) en het beekdalen-landschap in Oost-Gelderland (subcentreurop district), met name de Achterhoek.

Het Gelders district, vooral de Veluwe, wordt goed geïnventariseerd door actieve groepen uit Apeldoorn, Arnhem en Wageningen. Rond Apeldoorn is dit jaar het sprengengebied bij Niersen geïnventariseerd. L. Bos heeft ook een NMV-excursie geleid naar dit terrein. Verder is na een bosbrand de gelegenheid aangegrepen om op zoek te gaan naar brandplekpaddestoelen (zie het artikel in Coolia 41(1) van L. Bos). De KNNV-Arnhem is in 1996 gestart met een drie jaar durende inventarisatie voor Natuurmonumenten van het Deelerwoud (20 km²). Plaatselijk komen hier nog bedreigde soorten van schrale, strooisel-arme bossen en heiden voor, zoals Denneslijmkop (*Hygrophorus hypothejus*) en veel Heideknotszwam (*Clavaria argillacea*). Zie ook het verslag van de NMV-excursie en het stuk dat J. Dieker over het Deelerwoud heeft geschreven in Coolia 41(2). Verder worden in Wageningen regelmatig bijeenkomsten gehouden.

Uit het Gelderse rivierengebied komen veel minder waarnemingen binnen. De meeste waarnemingen komen nog van de overgangen naar de hogere zandgronden. Rondom Zutphen heeft J. Dieker een aantal van dergelijke plaatsen bezocht. Door de werkgroep uit Nijmegen wordt het stadspark "Stadlijk", deels een oude rivierbedding, geïnventariseerd, waarover meer bij de excursieverslagen.

Het slechtst bezocht is het subcentreurop district, wat erg jammer is omdat juist daar een grote soortenrijkdom te verwachten is. Uit het gegevensbestand van de NMV komt duidelijk naar voren dat de gebieden met de meeste bijzondere paddestoelsoorten, evenals voor hogere planten, gelegen zijn in Zuid-Limburg, de duinen én de rijkere gronden in de beekdalen en overgangen naar rivierdalen van met name Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht. Ten oosten van Nijmegen wordt het broekbos- en natte schraallandencomplex "De Bruuk" bij Groesbeek regelmatig bezocht. In dit laatste terrein worden ook permanente proefvlakken in verschillende typen graslanden en broekbossen bekeken. Onder de aansprekende soorten bevinden zich diverse wasplaten, knotszwammen en staalsteeltjes, Cantharel (*Cantharellus cibarius*), Gele stekelzwam (*Hydnum repandum*) en Goudgele hertezwam (*Pluteus leoninus*). In de uitgestrekte delen van het subcentreurop district ten oosten van de IJssel zijn de laatste twee jaar vrijwel geen gegevens verzameld.

Op 20 september 1997 is een gezamenlijke excursie georganiseerd voor de Gelderse NMV-leden. Ondanks het droge weer kwamen hier meer dan dertig leden op af. Vanwege de enthousiaste respons is het de bedoeling om ook in 1998 een Gelderse excursie te organiseren.

NMV-excursies

Landgoed Loenen (28 juni; N. Dam). Landgoed Loenen, met onder andere loofbos op kalkrijk zand en op klei en enkele lanen, ligt aan de noordzijde van de Waal ter hoogte van Ewijk. De veertien deelnemers zagen hier meer dan 60 soorten paddestoelen en veel regen. Nieuwe soorten voor het gebied waren enkele ascomyceten, slijmzwammen en korsten, waaronder een zeldzame paddestoel met de bijzonder onaantrekkelijke naam "Rondsporige stinkkorstzwam" (*Scytinostroma hemidichophyticum*). Morieljes werden hier

pas een maand later gevonden.

Bronbeken Niersen, Veluwe (19 juli; L. Bos). Dankzij de inventarisatie-activiteiten van de werkgroep uit Apeldoorn hoort dit terrein tot één van de beste van Gelderland. De plaatselijk vochtige grond leverde de veertien deelnemers 116 soorten op. In dit terrein van Kroondomeinen mogen omgewaaide bomen blijven liggen, waarop onder andere het Geelgerand elfenbankje (*Antrodiella hoehnelii*) werd gevonden. In het brongebied werden ook bijzondere mycorrhiza-soorten als Bittere boleet (*Tylopilus felleus*) en Pronksteelboleet (*Boletus calopus*) en enkele bijzondere vezelkoppen gevonden.

Lochem (20 september; E. Brouwer). In een zeer droog Landgoed Ampsen vond een vijftiental deelnemers ruim 120 soorten. Met name de russula's waren goed vertegenwoordigd met negen soorten. Opvallend talrijk in de normaal vochtige dennenbossen was de Papilrussula (*Russula caerulea*). Leuke vondsten waren een Dennevoetzwam (*Phaeolus schweinitzii*) in een beukenlaan, met de dichtstbijzijnde den of dennestronk op twintig meter afstand en een Zijdeachtige beursjeszwam (*Volvariella bombycina*) weggekropen in een gekapte beukestam. Het toch nog hoge aantal soorten doet vermoeden dat er in nattere tijden veel leuke vondsten gedaan kunnen worden in dit terrein.

Stadspark Staddijk, Nijmegen (25 oktober; N. Dam). In het pas 25 jaar oude stadspark Staddijk wordt bewust een paddestoelvriendelijk beheer toegepast. De bodem bestaat afwisselend uit zand, leem en klei. Er zijn schrale graslanden en bosschages van diverse ouderdom aanwezig. Een bezoek met, alweer, 14 deelnemers en met gunstig weer leverde 211 soorten op, waardoor het totaal aantal uit dit gebied gemelde soorten na enkele jaren vrij intensief inventariseren al tegen de vijfhonderd loopt! Met name op grazige en strooiselarme plekken onder bomen op vochtige leem- en zandgrond zijn veel mycorrhiza-soorten gevonden. Zo waren er bijvoorbeeld 19 soorten gordijnzwammen te melden. Tenslotte zijn er zeer waarschijnlijk ook twee nieuwkomers voor Nederland waargenomen: *Daldinia occidentalis*, een Houtskoolzwam met een steel, en *Lamprospora tuberculata*, een klein oranje Mosschijfje.

Schovenhorst, Veluwe (8 november; W. Gams). Schovenhorst is bij de meesten inmiddels een bekende excursielocatie. Tijdens de excursie werden twee proeftuinen met veel soorten oude bomen en dus bijzondere substraten bezocht: het Klein Pinetum en Groot Schovenhorst. Rode borstelzwam (*Hymenochaete cruenta*), op Zilver spar, is hier al aanwezig vanaf 1958. Een andere zeer zeldzame houtbewoner die gevonden werd is de Rozetkaaszwam (*Oligoporus floriformis*). Verder was het de tijd voor mycena's, zoals Varenmycena (*Mycena pterigena*), Kleine beukebladmycena (*Mycena capillaris*) en zelfs Goudrandmycena (*Mycena aurantiomarginata*). In totaal kregen 124 soorten een naam.

Deelerwoud, Veluwe (15 november; J. Dieker; wegens verhindering C. van der Wilde). Het Deelerwoud is gelegen op een snijpunt van twee stuwwalcomplexen op de zuidoostelijke Veluwe. Grote open golvende vergraste heidevelden wisselen af met diverse bostypen en kleine schrale heideterreintjes. Met Herefordrunderen wordt ernaar gestreefd

het terrein open te houden. De wandelroute ging door 4 kilometerhokken. Flink wat nattigheid en het ontbreken van nachtvorsten in de periode voor de excursie zorgden voor een kleine opbloei van heel wat soorten paddestoelen. Het weer tijdens de excursie is te omschrijven als een sombere druilerige herfsttag met af en toe een beetje motregen. Er zijn 28 nieuwe soorten voor dit terrein vastgesteld. Vermeldenswaard is een tiental Rode Lijst soorten zoals Grijs vorkplaat (*Cantharellula umbonata*), Zandpadgordijnzwam (*Cortinarius fusisporus*), Okervoetsatijnzwam (*Entoloma vinaceum*), Denneslijmkop (*Hygrophorus hypothejus*), Heidezwavelkop (*Psilocybe ericea*), Grauwroze dennezwam (*Skeletocutis carneogrisea*), Gele ridderzwam (*Tricholoma equestre*) en Heideknotszwam (*Clavaria argillacea*). Deze laatste soort is inmiddels in zes kilometerhokken in flinke aantallen gezien. Geleidelijk ontstaat er een beeld dat het Deelerwoud op mycologisch gebied nog heel wat verrassingen te bieden heeft, vooral wat betreft de korstzwammen op dood hout en de soorten van schrale standplaatsen.

NOORD-HOLLAND (M. Groenendaal). In Noord-Holland ontbrak het tot voor kort aan gegevens uit twee gebiedstypen:

1. Het stedelijk gebied beslaat een groot deel van het oppervlak en in de toekomst zullen nog meer waarnemingen van dit milieutype afkomstig zijn. Toch was het aantal waarnemingen relatief gering. Gelukkig voorziet R. Chrispijn in deze leemte. Alleen al over 1996 kreeg ik ruim 250 formulieren van hem; allemaal uit Amsterdam. Over 1997 een dergelijk pakket!
2. Het overwegend agrarische gebied in het noord-oosten van de provincie. Het lijkt er een onaantrekkelijk excursiegebied en bovendien wonen er weinig mycologen. Gelukkig wordt er vanuit Schagen (D. Wolfskeel) en sinds kort vanuit Enkhuizen (A. Gutter) actie ondernomen.

Wat betreft het Texel-weekend dat van 31 oktober tot 2 november gehouden is; het was een geslaagd weekend ondanks de voorafgaande vorst. Het totaal aantal nieuwe soorten voor dit eiland bedroeg ongeveer 40. Er volgt nog een verslagje in Coolia.

NMV-excursie

Amsterdam Gaasperplaspark (25 oktober; R. Chrispijn). Dit jonge park ligt dicht bij Weesp in Amsterdam-Zuidoost; verdeeld over twee kilometerhokken. De twee soortenlijsten met respectievelijk 77 en 61 soorten bestaan voor het grootste deel uit echte "macromyceten" waar onder drie Ridderzwammen, vijf *Agaricus* soorten (ook *A. geesterani*, de Toverchampignon) en *Lepiota carinii* (Bruingele stekelparasolzwam). Ook jonge parken zijn dus de moeite waard.

FLEVOLAND (G.C.N. van Zanen). In 1997 zijn 121 excursies gehouden, waarbij 73 kilometerhokken bezocht zijn, gelegen in 40 verschillende terreinen (bossen, stranden en graslanden). Dit heeft geresulteerd in 225 excursielijsten. Een groot deel van deze lijsten is afkomstig van kleine privé-bezoeken aan terreinen in en om de eigen woonplaats.

De grote excursies, geconvoceerd in de nieuwsbrief van de werkgroep en/of in Coolia, zijn georganiseerd door de Werkgroep Mycologisch Onderzoek IJsselmeerpolders, waarvan de leden overwegend niet in Flevoland maar in de omliggende provincies wonen.

Verder zijn er nog twee verenigingsexcursies gehouden en drie excursies voor andere "groene" verenigingen. Alle wel geleid, om de beurt, door een lid van de werkgroep.

Onze proefvakken in Roggebotzand, Abbertbos en Oostvaardersplassen hebben we resp. vier, vier en drie keren bezocht. We hopen dit werk in afzienbare tijd een keer te kunnen evalueren.

Aangezien het aantal werkgroepleden gering is in verhouding tot het enorme bosareaal, plus de belangrijke strandstroken, is er geen of nauwelijks tijd beschikbaar om kilometerhokken in de agrarische sector of langs wegen te inspecteren. Er zijn nog geen lokale werkgroepjes actief in de grotere plaatsen van Flevoland. Dat is dus nog verre toekomstmuziek.

Het SBB-rapport "Paddestoelen en GIS", uitgekomen in december 1996, is in de loop van 1997 uitvoerig bestudeerd. Op de Algemene Ledenvergadering op 4 april dit jaar zijn de aanwezigen in korte trekken op de hoogte gebracht van de inhoud van dat rapport.

NMV-excursie

Horsterwold (3 mei; F.J. Stokman). Er stond voor deze dag een bezoek aan het Horsterwold "De Banken" gepland. Gekozen werd voor zowel loof- als naaldhoutpercelen. Vijf dagen voor de excursie viel er, na langdurige droogte, toch nog wat regen. Er meldden zich negen deelnemers, die met elkaar toch nog in twee percelen respectievelijk 33 en 39 soorten wisten te vinden, waaronder veel korstjes en asco's. Bijzonder was de vondst van de zelden gemelde *Mollisia lividofusca*.

UTRECHT (E. v.d. Dool). In 1997 is wat extra aandacht besteed aan lang niet bezochte en nog onbekende kleibossen. Dit naar aanleiding van het kleibossen-overzichtsartikel uit de Coolia van april van dat jaar.

Het inmiddels weer opengestelde landgoed Sterkenburg was zo'n landgoed dat sinds 1967, dus 30 jaar lang, niet bezocht was. Groot was onze verbazing dat we er prompt enkele zeer zeldzame soorten terugvonden waaraan destijds dit landgoed ook zijn vermaardheid ontleende, namelijk *Boletus appendiculatus* (Geelnetboleet) en *Russula alutacea*.

Twee nieuw bezochte kleibossen betroffen de landgoederen Middenhoek en Vreedenhoff ten noorden van Nieuwersluis aan de Vecht. Met name de laatste van de twee bleek het neusje van de zalm met een groot aantal mycorrhiza-soorten waaronder nogal wat specifieke kleibossoorten, zoals *Amanita ceciliae* (Prachtamaniet), *Amanita lividopallescens* (Bleke amaniet), *Boletus impolitus* (Goudporieboleet), *Boletus porosporus* (Sombere fluweelboleet), *Lactarius ichoratus* (Rode kleibosmelkzwam), *Russula grisea* (Duifrussula), *Russula odorata* (Geurige russula), *Russula pseudointegra* (Kleibosrussula). En de wasplaten: *Hygrocybe aurantioviscida* (Hooilandwasplaat) en *Hygrocybe unguinosa* (Grauwe wasplaat).

Fort Hoofddijk is een enkele jaren geleden 'nieuw ontdekte' kleiboslocatie welke voorlopig nog veel kleibossoorten oplevert. Dit jaar waren dat onder andere *Tricholoma columbetta* (Witte duifridderzwam) en *Russula olivacea* (Gerimpelde russula).

Dat het stedelijk gebied van de gemeente Utrecht zelf ook aardige vondsten kan opleveren toonde P.J. Keizer enkele jaren geleden aan met een spectaculaire vondst van *Chalciporus rubinus* (Robijnboleet) in het Beatrixpark. Dit jaar trof hij de wasplaten *Hygrocybe psittacina* (Papegaaizwammetje), *Hygrocybe obrussea* (Wantsenwasplaat) en *Hygrocybe unguinosa* (Grauwe wasplaat) aan op een dijkje langs de Zilveren Schaats en binnen de bebouwde kom van de stad.

Ook in reeds vaak bezochte kleiboslanen werden dit jaar, na lange tijd, weer wat oude bekenden teruggemeld, zoals *Lyophyllum deliberatum* (Taaie rouwridderzwam) van de Notenlaan bij Zeist, waarvan de laatste waarneming dateerde van 1974, evenals *Cortinarius turgidus* (Witte zijdegordijnzwam), laatste waarneming 1981 en *Cortinarius diosmus* (Welriekende gordijnzwam).

Voor 1998 staan eveneens bezoeken aan nog onbekende dan wel alleen van vroeger bekende en sindsdien slecht bezochte terreinen op het programma. In dat kader is dit jaar ook wat meer aandacht voor de paddestoelen van de diverse nog onbekende forten, mede vanwege de plan-ontwikkeling met het oog op de te wijzigen bestemming.

Verder wordt 1998 het jaar van de duizendste paddestoelensoort voor Nijenrode, zeker als we daar met een districtsexcursie nog even extra aandacht aan besteden. Voor de inventarisatie van de forten kunnen geïnteresseerden zich nu al bij mij aanmelden.

NMV-excursies

Landgoed Rijnwijk en Heidestein (24 mei; P.J. Keizer). De weersomstandigheden voor deze dag waren zeer goed; het was zonnig en vrij warm, na een regenrijke periode. Er kwamen dan ook 23 deelnemers naar deze excursie. De opzichter van het terrein was wat overdonderd door dit aantal; hij had gerekend op ongeveer tien personen. Wellicht was de regen te kort geleden want het aantal fungi kwam met hulp van korstjes en klein grut op 59 soorten. Hoe vochtig het loofbos was blijkt uit de vondst van *Steccherinum fimbriatum* (Geveerde raspzwam) en *Coronicium alboglaucum* (Ongekroond kroonkorstje). Het bezoek aan Heidestein was goed voor 48 soorten.

Fort Hoofddijk (9 augustus; W.G. van der Sluis). Het fort waarop de botanische tuin van de Rijksuniversiteit Utrecht gevestigd is, is pas sinds enkele jaren bekend als een rijke "kleiboslaan". De paddestoelenrijke locatie betreft het buitenfort waar verspreid eiken en populieren staan. De excursie viel net met een russula-gunstige periode samen. Negen russulasoorten werden aangetroffen waaronder *R. farinipes* (Bleelgele russula) en *R. pseudointegra* (Kleibosrussula).

ZUID-HOLLAND (M. Nauta). Ook in 1997 werd in deze regio ijverig geïnventariseerd en formulieren ingevuld, waarbij de nadruk weer lag op de duingebieden en de landgoederen aan de binnenduinstrand. Er werden weer een paar honderd lijsten ontvangen van de diverse werkgroepen en apart opererende inventariseerders. De nieuwe werkgroep uit Zoetermeer bezoekt vooral terreinen in het binnenland, hopelijk worden daardoor de nog immer lege kilometerhokken in dit gebied daarmee opgevuld.

NMV-excursies

Duingebied Meijndel-Meeuwenhoek (31 mei; M. Nauta en L. Jalink) en in het najaar **de Ganzenhoek** (6 september; R.S. ten Cate), een naaldbos grenzend aan het duingebied Meijndel. De excursie in het voorjaar leverde door de aanzienlijke droogte vrijwel alleen interessante kleinere ascomyceten op. De door misverstanden niet doorgegangene excursie naar de Amsterdamse Waterleidingduinen (22 november) leverde toch nog een aantal soorten op doordat de deelnemers op eigen houtje er op uit zijn getrokken.

Samenvattend kan gesteld worden dat de lege plekken op de kaart van deze regio dringend dienen te worden opgevuld. Helaas zijn dit doorgaans gebieden met minder soorten, hoewel er vaak verrassende vondsten gedaan worden.

RIJNMOND (A. v.d.Berg). In het district Rijnmond breidt het aantal karteringsprojecten zich langzaam uit. Het verzamelen van gegevens uit de stadsparken in en om Rotterdam gaat gestaag voort, mede in contact met lokale KNNV-afdelingen.

In het vorige bericht heb ik verzuimd de Werkgroep Oostvoorne te vermelden. Ik werd onlangs aangenaam verrast door een pak formulieren met opnames van verschillende plekken in het vermaarde duingebied. Hoewel de activiteiten wat verminderd zijn wordt dit gebied nog regelmatig bezocht door een groepje van vier mensen.

De belangrijkste recente ontwikkeling was echter de oprichting van de Werkgroep Oud-Beijerland die sinds augustus 1997 elke tweede en vierde woensdag van de maand bij elkaar komt, op initiatief van Grieta Fransen. Deze werkgroep wordt geleid door John en Ellen Bakker en heeft daardoor toegang tot een schitterende locatie: het Natuurbezoekerscentrum Klein Profijt van het Hoeksche Waardse Landschap. Naast de microscopen en boeken die door de deelnemers worden meegesjouwd, zijn er ook reeds vele spullen "van de zaak" beschikbaar. Momenteel hebben we een vaste kern van ongeveer tien personen, in paddestoelrijke tijden komen er zo nu en dan nog enkele anderen. De formule blijkt succesvol: 's middags is er een excursie en 's avonds wordt er gedetermineerd. Om het overzichtelijk te houden is gekozen voor twee vaste locaties die afwisselend worden bezocht: de Zeehondenplaat, een moeilijk toegankelijk gebied naast de bekende Esscheplaat, en het Zomerlandse Gorzenbos nabij de Heinenoordtunnel. De mycologische ervaringen tot nu toe vallen duidelijk in het voordeel van het bos uit.

De activiteiten van de werkgroep werden voor het eerst gepresenteerd op de Zuid-Hollandse Zwamdag (28 maart 1998). Reeds bij de tweede editie heeft dit goed bezochte evenement zich bewezen als o.a. een contactdag voor al onze karteerders. We hadden de indruk dat er nogal wat mensen waren die kennelijk de drempel wat lager vonden dan van de landelijke bijeenkomsten. De kwaliteit van het door Grieta Fransen opgestelde programma was echter zeker niet lager.

Ik zou hierbij nog eens alle actieve of potentiële individuele karteerders willen oproepen uit hun eigen "hokje" te komen en zich, in welk verband dan ook, bij anderen aan te sluiten. Het is buitengewoon stimulerend en leerzaam. Het voorkomt dat je ongemerkt overtuigd raakt van je eigen kennis. De werkgroep Oud-Beijerland heeft aan ruimte voorlopig geen gebrek. Voor adressen van contactpersonen in ons district zie de Lijst van Paddestoelenwerkgroepen in Coolia 41(2).

We streven er naar alle gegevens vanuit dit district op diskette in te leveren. Dat

houdt in dat we met vereende krachten zelf de nog op formuleren binnenkomende gegevens na controle met de computer verwerken. Daar willen we natuurlijk vanaf. Vandaar ook hier nog eens de oproep om gebruik te maken van het invoerprogramma (informatie bij de districtscoördinator).

ZEELAND (A. Jacobs). Het jaar 1997 werd voor de Zeeuwse Paddestoelenwerkgroep overschaduwd door het overlijden van Wim Kuijs. We waren ineens onze werkgroep leider, raadsman en vriend kwijt!

Iedereen is er echter van overtuigd dat we dóór moeten gaan met het paddestoelenonderzoek in Zeeland, dat zou Wim immers ook gewild hebben. Het was dan ook onze bedoeling om de geplande excursies gewoon door te laten gaan, maar helaas gooide het weer behoorlijk roet in 't eten. Lange tijd was het erg droog en er waren dientengevolge een poos vrijwel geen paddestoelen te vinden. Daardoor zijn er slechts twee van de vijf excursies doorgegaan.

Op 30 augustus was er een excursie op Goeree in het natuurgebied "De Punt" bij Ouddorp. Het had de week ervoor wat geregend, waardoor zich aarzelend enkele plaatjeszwammen vertoonden, maar het merendeel moest toch komen van korstzwammen, Pyrenomyceten e.d. Tussen de meestal vrij algemene tot zeer algemene soorten staat ook *Exidia saccharina* (Bruinesuikerzwam) genoteerd, een zeldzame trilzwam die op een elzetak groeide. In totaal werden 33 soorten op naam gebracht.


Negen leden van de werkgroep gingen op 18 oktober in Oranjestad op Walcheren op zoek naar paddestoelen. Al had het pas geregend, het was nog steeds niet bepaald nat te noemen. Men kwam tot een totaallijst van 35, veelal algemene soorten. Vooral in de laatste drie maanden van het jaar zijn er, dankzij het zachte en vochtige weer, nog regelmatig werkgroep leden met z'n tweeën of drieën op uit getrokken en hebben daarbij heel wat leuke vondsten gedaan.

Op de najaarsbijeenkomst van 12 november moest allereerst een nieuwe werkgroep leider gekozen worden. Thijs Franse was gelukkig bereid deze taak op zich te nemen. Ondergetekende blijft secretaresse. Tevens werd bekeken welke "lege hokken" ieder werkgroep lid in zijn/haar omgeving heeft, zodat men hopelijk de komende jaren doelgericht witte plekken gaat opvullen.

NOORD-BRABANT (F. Benjaminsen). Het jaar 1997 was goed voor de kartering van Brabant. Op floppy en via formulieren kwamen er 323 lijsten binnen. Daarvan waren er 77 met gegevens uit nieuwe kilometerhokken. Er werden ook weer heel wat nieuwe soorten voor Nederland gemeld (12), voornamelijk Ascomyceten. Figuur 3 toont het totaal aantal tot mei 1998 ingevoerde vondsten. Belangrijk is dat er in Tilburg nu ook een actieve groep met karteren aan de gang is gegaan. Een gebied, "Kaaistoep" geheten wordt nu constant geïnventariseerd; het is van de Waterleidingmaatschappij en ongeveer acht kilometerhokken groot.

NMV-excursies

De Appelzak (14 juni; J. Gelderblom). In het programma stond voor deze dag aangekondigd: "De Appelzak bij Moerdijk", met jong loofbos op kalkhoudende grond. Er



kwamen acht deelnemers op af, waarvan zeven uit regio Breda! Gelukkig was het weer redelijk tot goed voor voorjaarsfungi. We vonden dan ook 66 soorten waaronder *Coprinus plagioporus* (Paarsbruine donsinktzwam), *C. sclerocystidiosus* (Bruindonzige inktzwam) en *C. pseudofriesii* op houtsnipperpaden. De laatste soort staat niet in het "Overzicht", maar is volgens C. Uljé toch vrij algemeen. Verder ook *Conocybe crispa* (Kroesplaatbreeksteeltje) in grasland en een fors Breeksteeltje langs een houtsnipperpad. Deze werd gedetermineerd als *C. bulbifera* (nieuw voor Nederland). Later vond E. Arnolds dat deze toch, ondanks het bezit van viersporige basidiën, tot de zeer verwante *C. inocybeoides* behoort. Deze naam was al eerder in enkele karteringslijsten genoemd. Verder moet ook genoemd worden: *Psilocybe halophila* (Helmstropharia), die tussen Helm op het strandje stond en tot nu toe slechts bekend was van de Wadden.

De Geelders bij Boxtel (5 juli; M.C. Broekema-Bruinsma). Deze excursie telde 13 deelnemers en het aantal gevonden soorten bedroeg 112; dat is voor een zomerexcursie op zandgrond behoorlijk veel. Er werden schitterende exemplaren van *Suillus grevillei* (Gele ringboleet) aangetroffen en ook van de bedreigde *Gymnopilus fulgens* (Veenvlamhoed). Verder werd een Bekerzwam gevonden, die gedetermineerd werd als *Aleuria luteonitens* (Berk. & Br.) Gillet.

HELMOND (L. Raaymakers). De werkgroep Helmond is nog steeds bezig met het inventariseren van De Weijer (thans 660 soorten) en het Coovels bos (ca. 1025 soorten). Daarnaast wordt af en toe in het rayon een ander gebied bezocht. De droogte in 1997 heeft hierbij geen spectaculaire ontdekkingen opgeleverd qua gebieden en soorten. Er wordt gewerkt aan een tussentijds verslag over het onderzoek in De Weijer.

NMV-excursie

Vlierden "De Bikkels" (6 september; L. Raaymakers). Op deze stralend zonnige dag werd door vijf personen een jeneverbesstruweel bezocht dat bekend is als "De Bikkels" in de Vlierdense bossen te Deurne (N.Br.). Dit struweel is tevens begroeid met Struikhei en Berken, en wordt omgeven door een Grove-dennenbos gemengd met loofhout. Behalve warm was het ook erg droog, waardoor het totaal aantal van 56 soorten dan ook absoluut

De Jeneverbes

*Daar staan de stekelig' en stijve staken
die 't heideveld bewaken
als schimmen uit een grijs verleden,
zo krom en moe-gestreden;
stuurs in zichzelf gekeerd en onbemind
te schoudersturken in de wind.*

B. de Vries

een meevaller was. Met 13 soorten vormden de Myxomyceten een belangrijk aandeel van de vondsten. Het gebied werd bezocht om eventueel enkele bijzondere soorten voor dit biotoop te vinden. Op Jeneverbes groeiden de volgende fungi: *Amylostereum laevigatum* (Jeneverbeskorstzwam), *Hypochniciellum molle* (Bleekgeel plooiwies), beide bedreigde soorten, en *Lophodermium juniperinum*, die massaal op dode naalden voorkwam. Enkele exemplaren van *Entoloma fernandae* (Heidesatijnzwam) behoorden tot de spaarzame plaatjeszwammen die met deze droogte nog te vinden waren. Bij zulke omstandigheden krijgt het kleine spul uiteraard meer aandacht waarbij o.a. *Nidularia deformis* (Eierzakje) en *Lachnum ciliare* (Langharig franjekelkje) werden ontdekt. Het was geen overweldigend succesvolle excursie, maar de deelnemers gingen wel met een tevreden gevoel naar huis.

LIMBURG (P. Jennen). De karteringsactiviteiten in Limburg wil ik voor het gemak hier even opsplitsen in drie groepen: (1) de regionale werkgroepen PSL en Mycolo-groep van het IVN-Weert, (2) privé-personen die in Limburg wonen en (3) privé-personen van buiten Limburg.

1. Met de werkgroep houden we jaarlijks een vijftien- tot twintigtal excursies. (Het verslag van P. Kelderman in het contactorgaan illustreert duidelijk dat de leden zeer betrokken en actief zijn; B.d.V.) Het programma wordt vanaf dit jaar ook in de Coolia opgenomen. De laatste twee jaar wordt het karteringswerk wat gericht. Zo werden het afgelopen jaar, en worden nog steeds, wat intensiever bezocht: de terreinen Hochter Bampd en Ingendael/Meerssenderbroek, beide naar aanleiding van een verzoek van de Stichting Ark, die natuurterreinen in beek- en rivierdalen beheert, de Schinveldse Bossen, naar aanleiding van een (mondeling) verzoek van de terreinbeheerder, en De Rolle, een met jong loofbos omgroeide kleiput. Al deze terreinen zullen zeker nog enkele jaren intensief onderzocht worden.

Naar aanleiding van de lezing van Leo Jalink op de nieuwjaarsbijeenkomst zullen we kijken of we van oudsher goede gebieden die de laatste tijd niet meer bezocht zijn, via inpassing in het excursieprogramma opnieuw kunnen onderzoeken. Dit betreft dan o.a. kasteel Neubourg/Gulpdal, en het Beersdal ten noorden van Heerlen. We wachten hier af of er nog meer terreinen zijn.

2. Naast de gezamenlijk excursies wordt er natuurlijk vrij veel geïnventariseerd door individuele personen, vooral in het Elsloo- en Bunderbos, de Groote Heide en omgeving te Venlo, en de omgeving van Valkenburg. Er zal getracht worden de gegevensstroom hier wat te stroomlijnen.

3. Voor mycologen van buiten Limburg geldt dat ze ofwel de bekende toppers bezoeken, zoals het genoemde Bunderbos, de Schinveldse Bossen en de wasplatenweijtes in Zuid-Limburg, ofwel gericht witte vlekken. Dit is op zich een positieve ontwikkeling.

Het aantal lijsten dat naar de districtscoördinator gestuurd wordt, geeft echter aan dat Limburg minder vaak wordt bezocht dan gedacht, iets nauwkeuriger gezegd: door minder verschillende personen dan gedacht. U wordt dus van harte uitgenodigd.

NMV-excursies

De NMV-excursie van 26 april naar het Meinweg-gebied ging niet door vanwege de droogte. Ook van de regionale excursies vielen er uit of ze werden gehouden (4 oktober) op plaatsen waar wel een bui gevallen was.

Putberg (12 juli; W. Simons en P. Kelderman). Op 12 juli was er een PSL-NMV excursie naar de Putberg. De verwachtingen waren hooggespannen. Toch werd het niet echt "je van het". Het was er broeierig warm. Desondanks haalden zo'n 70 soorten de lijst, waaronder massaal het Bosstaalsteeltje (*Entoloma incarnatofuscescens*), en voorts o.a. de Grijsvezelige beurszwam (*Volvariella murinella*) en de Bruine modderbekerzwam (*Peziza limnaea*).

Berger Heide (29 november; R. Gorissen). Op 29 november organiseerde de Paddestoelenwerkgroep Rijk van Nijmegen een NMV-excursie naar een natuurgebied tussen Nieuw-Bergen en de Duitse grens. Ondanks het late tijdstip werden maar liefst 114 soorten gevonden. Onder de zeer tot uiterst zeldzame waren het Bramemeelschijfje (*Aleurodiscus aurantius*), de Kleine oranje bekerzwam (*Aleuria exigua*), en (wederom!) het Slijmrandkaalkopje (*Psilocybe liniformans*). Ook heel fraai was een vondst van de bedreigde Grijze vorkplaat (*Cantharellula umbonata*).

KARTERINGS-GEGEVENS VAN PADDESTOELEN AANVRAGEN; DOOR WIE EN WAAR? (E. Jansen)

Via een "Nieuwsbrief" wordt u jaarlijks op de hoogte gehouden over de stand van zaken van het paddestoelenkarteringsproject. Ondermeer hoeveel gegevens er bij gekomen zijn, hoeveel meer soorten er gevonden zijn en in hoeveel uurhokken er nog nooit een paddestoel gevonden is. Dit is uiteraard leuk om te weten, maar het is vooral belangrijk dat deze gegevens gebruikt worden, bijvoorbeeld voor het geven van beheersadviezen of door de individuele karteerder om te weten of er in een voor haar/hem interessant gebied al eerder gegevens verzameld zijn. Onder bepaalde voorwaarden kan iedereen gebruik maken van het paddestoelenbestand.

Tot nu toe kon elke waarnemer haar/zijn eigen gegevens rechtstreeks aanvragen bij de landelijke coördinator van het karteringsproject. Wilde men deze eigen gegevens uitbreiden met waarnemingen van anderen die in een bepaald gebied geïnventariseerd hadden, dan kon men deze aanvragen bij de secretaris van de Wetenschappelijke Commissie. Hierin komt met ingang van komende herfst verandering.

De meeste districtscoördinatoren krijgen de beschikking over alle gegevens uit hun district. Het voordeel hiervan kan ondermeer zijn, dat zij daarmee overzicht hebben over "witte" en "grijze" hokken in hun district en karteerders hierop kunnen attenderen. Voor zover ze dat kunnen behandelen de districtscoördinatoren de aanvragen voor gegevens van leden uit hun district. De regels die hiervoor gelden zijn: