

DE NMV-EXCURSIES VAN 1999

B. de Vries en anderen

De NMV-excursies bleken in 1999 òf boven verwachting goed te zijn òf zo tegen te vallen dat men zich haast schaamde om de dag in de excursieverslagen op te nemen. Het jaar leek klimatologisch gezien op 1998. Was het in april nog een lekker zonnetje, in de zomer leek het wel de hel van Sahel. De zomer was af en toe dus heet en droog en daarvoor en daarna waren er hoge 'ups' en lage 'downs'. De tien afgelastingen spreken voor zich. Als kampioen van het jaar geldt de excursie op 16 oktober naar het Voorsterbos. Voor meerdere provincies was het jaar een 'topper' (Noord-Brabant, Friesland en Drenthe) met meerdere excursies die veel zeldzame soorten opleverden, maar Zeeland kwam er helaas bekaaid af. Het weersverloop na de laatste excursie, een zachte winter, zou eventueel een voortzetting van het programma tot in januari hebben gerechtvaardigd, ware het niet dat dan de verwerking van de gegevens in het gedrang zou komen. Het mediterrane klimaat rukt op en het seizoen verschuift. Is winterexcursies misschien een ideetje voor als we allemaal 'Spotter' geworden zijn?

17 april Alphen a/d Rijn (C. Uljé)

Het gebied rond de Zegerplas in Alphen a/d Rijn was het doelwit van de excursie. Gemeten naar randstadmaatstaven is het openbaar groen hier ruim bemeten en herbergt het verschillende biotopen.

's Ochtends trokken we door het parkachtige deel ten zuidwesten van de plas en door een zeer vochtige, 's winters natte, met wilg en populier begroeide laagte, ooit bedoeld als alternatieve route voor de Oude Rijn. Na de middag werd 'Zegersloot' bezocht, een nieuw aangelegd recreatiegebied ten noorden van de Zegerplas. Dit terrein wordt begraasd door Galloway-runderen. Op de terugweg werd gestruind langs het restant van de rivier Kromme Aar. Het rechte Aarkanaal vonden de planologen beter.

Na vele dagen met regen was het op deze dag gelukkig voornamelijk droog en zacht. De regen van die dag viel in de lunchpauze waarvoor we een droge en gezellige plek hadden gevonden. April was nogal koud geweest zodat we weinig 'echte' paddestoelen verwachtten en dat bleek uit te komen. Naast een viertal gewone inktzwammen vonden we zes andere Agaricales, o.a. de Oranje dwergmycena (*Mycena acicula*), de Voorjaarsfranjehoed (*Psathyrella spadiceogrisea*) en een mooie groep jonge Voorjaarspronkridderzwammen (*Calocybe gambosa*). De andere fungi op de lijst van 60 soorten bestond uit asco's en ander klein spul. Dankzij een aantal specialisten op dit gebied is het nog een aardig lijstje geworden. Enkele leuke vondsten zijn: Bokaalkluifzwam (*Helvella acetabulum*), Wit- en Dofpaars wolschijfje (*Lachnella villosa* en *L. alboviolascens*), Fraai franjekelkje (*Trichopeziza mollissima*) en een prachtige collectie van de Broekboswimperzwam (*Scutellinia subhirtella* sensu Kullman). De laatste groeide massaal op een rottend pak kranten. Mogelijk vond F. Ligtendberg hier ook de eerste Nederlandse vondst van *Pyrenopeziza pastinacea* (Nannf.) Gremmen.

24 april Schoorl, De Kerf (M. Groenendaal)

Ongeveer tien excursiedeelnemers gingen met mooi wandelweer naar de Kerf in Schoorl. Het is een open duinterrein en erg droogtegevoelig. Er waren dan ook weinig verse paddestoelen. Gelukkig waren er wel Gewone morieljes te bewonderen (*Morchella esculenta*), alle klein van postuur, en in het kruipwilgstruweel waren er verscheidene Voorjaarsgordijnzwammen (*Cortinarius romagnesii*). Op de terugweg door het bos werd er langs het fietspad nog een groepje Grote schotelkluifzwammen ontdekt (*Helvella queletii*). Op de Eeuwige laan in Bergen tenslotte toonde P.J. Keizer ons nog een oude Voorjaarskluifzwam (*Gyromitra esculenta*). Ondanks de bescheiden oogst was het een

aangename tocht.

8 mei Vorden (E. Brouwer)

Het was in voorgaande weken erg droog weer geweest, maar de gedachte aan een wandeling in dit mooie gebied trok toch nog twaalf deelnemers. Er werden weinig zeldzame soorten gevonden: naast tien Agaricales 63 andere soorten. Leuke vondsten waren: Gladharig franjekelkje (*Lasiobelonium nidulum*) op overjarige, liggende stengels van salomonszegel, *Octospora lilacina*, een soort groeiend op lemige bodem met beginnende mosgroei, en een zeldzame stinkende korst met een moeilijke naam: Rondsporige stinkkorstzwam (*Scytinostroma hemidichophyticum*). De laatste groeit op loofhouttakken in voedselrijke biotopen. Het was dus wel de moeite waard!

15 mei Amsterdamse Waterleidingduinen (L. Jalink)

Op deze dag werd gekozen voor de Vlooienhoek, een beschutte, voormalige landbouwvallei vlakbij Zandvoort. De vallei is dichtgegroeid met meidoorn en staat bekend om zijn rijkdom aan aardsterren. De 34 (!) deelnemers van deze excursie kwamen goed aan hun trekken. Het weer was heerlijk; lichtbewolkt en zonnig. De meidoorns stonden vol in bloei. Er werden 45 soorten fungi genoteerd. Daarnaast zagen we prachtige zandhagedissen met smaragdgroene flanken, een paar mierenleeuwen, hele velden bloeiend duinviooltje en een helling vol walstrobremraap. Van de paddestoelen moet zeker de Meidoornbesgeweizwam (*Xylaria oxyacanthae*) genoemd worden, groeiend op gefossiliseerde vruchten van de meidoorn. Deze zwam was dit jaar vrij talrijk. Verder zijn het Spatelhoortje (*Calocera pallidospathulata*) en de IJskristalzwam (*Stipella vermiformis*) nog het vermelden waard. Van de aardsterren vonden we de Peperbus (*Myriostoma coliforme*), de Forse aardster (*Geastrum coronatum*) en de Baretaardster (*Geastrum triplex*). Van de beide laatste soorten werden ook de tulpenbol-stadia gevonden. De excursie werd afgesloten met een pilsje op een terras bij de ingang van het terrein.

29 mei De Appelzak (H.W. Hendrickx & J. Gelderblom)

De resultaten van deze dag waren niet om over naar huis te schrijven. Het zandige duinachtige terrein gaf door droge weersomstandigheden zijn geheimen niet prijs. De totaalscore kwam op acht soorten.

12 juni 't Hout, Susteren (P. Kelderman)

Het was droog zoals overal. Toch verwachtten tien personen nog wel iets te vinden; en verder is een wandeling bij mooi weer in een mooie omgeving ook nooit weg. Het werd een lijst van 74 soorten waaronder het Kristalmosklokje (*Galerina nana*) en de Gespleten satijnzwam (*Entoloma scabiosum*).

10 juli Het Markiezaatsmeer (J. Gelderblom)

Ook deze excursiedag werd geteisterd door droogte. Ook de werktemperatuur was veel te hoog. Toch kwamen er zeven deelnemers. Men verwachtte misschien verkoeling in dit biesbos-achtige terrein. Er stond massaal Kleinsporige galgordijnzwam (*Cortinarius eburneus*) en ook de Witte galgordijnzwam (*Cortinarius emollitus*) was van de partij. Verder vond men Spitse spleetvezelkop (*Inocybe flavella* var. *flavella*) en de Roetkluiwzwam (*Helvella atra*). Het totaal kwam toch nog op 26 soorten.

17 juli Arnhem, Warnsborn (E. Jansen)

Op het landgoed Warnsborn bij Arnhem ontspringen diverse kleine beekjes, waardoor er ook in deze droge julimaand nog wel het een en ander te beleven viel.

Voordat deze excursiedag aanbrak waren we al 'in klein comité' van te voren in dit gebied op stap geweest op 8 juli. Toen leverde dit prachtige bos met bronnetjes en annex heideveldje 54 soorten op waaronder zes soorten *Russula* en twee leuke korstjes: de Roze dennenschorszwam (*Peniophora pini*) en het Priemharig korstje (*Subulicystidium longispora*).

Op de eigenlijke excursiedag kwamen daar nog diverse soorten bij, onder andere zeven soorten *Russula* inclusief de Fijnplaatrussula (*Russula densifolia*) en twee vezelkoppen: de Gewone wolvezelkop (*Inocybe ovatocystis*) en de Vlokkige vezelkop (*Inocybe flocculosa*). Langs een beekje werd het Plooiplaatzwammetje (*Delicatula integrella*) gevonden. Voor een zomerexcursie van 13 deelnemers was 80 soorten een mooi resultaat.

24 juli Ratum, Tenkinkbos (N. Dam)

Het was allemaal mooi op deze dag: het weer, het landschap en het bos; het zuidoostelijke bosdeel was vrijwel ongestoord! Het mooie weer hield wel in dat het niet optimaal was voor paddestoelen. Het bos met zeer gevarieerde bodem (zand, veen en klei) leverde toch 86 soorten op. De Bittere boleet (*Tylopilus felleus*) stond er op veel plekken. Andere bijzonderheden waren: Stersporige wimperzwam (*Scutellinia legaliae*) en de Kleine satijnzwam (*Entoloma minutum*). Een mooi terrein voor de werkweek 2000!

14 augustus Amsterdamse Waterleidingduinen (M. Nauta)

Op de uitnodiging in Coolia stond 'tamelijk vochtig'. Dat bewoog twaalf deelnemers om ondanks het droge zomerweer toch te gaan. Er werden drie terreinen bezocht: Eiland van Rolvers west, Pannenland en Eiland van Rolvers oost. De oogst was niet alleen klein maar ook klein van formaat: allemaal kleine dingen en weinig plaatjeszwammen. De aantallen soorten bleven beneden de dertig (respectievelijk 28, 16 en 29).

21 augustus Baarnse bos en Paardenbosch bij Baarn (E. van den Dool)

De excursie ging te voet vanaf station Baarn naar het aan de andere kant van de spoorlijn gelegen Baarnse bos en het Paardenbosch. Verder werd ook nog een klein stukje van de natte heide van De Stulp bezocht. In de diep begreppelde bossen was het in de brede grasbermen onder beuken en eiken nog een beetje te droog. De meeste soorten werden gescoord in de kleine saprotrofensfeer. De meest bijzondere waarnemingen kwamen dan ook van de halm-, blad- en takbewonende soorten zoals Kleinsporige halminktzwam (*Coprinus phaeosporus*), *Mollisia escharodes*, en de Witte paardenhaartaailing (*Marasmius quercophilus*) op eikenblad. Het was de laatste excursie waar Frans Ligtenberg aanwezig was: hij overleed enkele dagen later. De diverse nadeterminaties van allerlei klein meegenomen materiaal zoals de Wimpertandjeszwam (*Hyphodontia subalutacea*) en het Geel houtvlieskelkje (*Hymenoscyphus calyculus*) die hij nog verricht heeft, typeren zijn ijver en speciale aandacht voor het kleine moois onder de paddestoelen.

28 augustus Junner Koeland (R. Chrispijn)

Deze excursie had eigenlijk later in het jaar moeten plaatsvinden, maar door een misverstand stonden er al op 28 augustus acht deelnemers op het station van Ommen. Het had de week ervoor wat geregend en alle mycologen dachten dat nu het seizoen zou beginnen, niet wetende dat de septembermaand de mooiste van deze eeuw zou worden. Dus hadden we nog geluk! En al bezochten we dan niet het Junner Koeland, toch vonden we zowaar nog enkele van de in de convocatie

aangekondigde wasplaten. Op een begraasd stuk grasland langs de Vecht groeiden de Elfenwasplaat (*Hygrocybe ceracea*) en een bleke ivoorkleurige weidewasplaat. Dit bleek de zeer zeldzame Bleke weidewasplaat (*Hygrocybe pratensis* var. *pallida*) te zijn.

De meeste tijd brachten we door in het bos: loofbos op rijkere bodem met hier en daar een enkele naaldboom. Vandaar de vondst van de Purperbruine mycena (*Mycena purpureofusca*), die uitsluitend op dood naaldhout groeit. Andere aardige vondsten waren Adonistrechterswam (*Clitocybe houghtonii*) en Bruinbultige franjehoed (*Psathyrella gossypina*).

's Middags werd een, in een leeg kilometerhok gelegen, bos bij de buurtschap Junne bezocht. Het eerste stuk was droog en saai en omdat de zon scheen, kreeg de stemming al gauw iets landerigs. Dat verbeterde toen, dichterbij de Vecht, rivierinvloeden in de bodem voor interessantere paddestoelen zorgden. Vooral een eikenberm met greppel was de moeite waard met vondsten als Abrikozenrussula (*Russula risigallina*) en Paarsstelige russula (*R. violeipes*). Op de terugweg passeerden we een maïsakker met langs de rand veel Vaalpaarse schijnridder (*Lepista sordida*) en Wijnkleurige champignon (*Agaricus semotus*). Het aantal soorten ontliep elkaar die dag niet veel: 78 in het eerste hok en 77 bij Junne.

4 september Kijfhoek (L. Bakker-Walter)

Het was al een tijdje droog, dus werd besloten alleen het bosrijke gedeelte van de Kijfhoek te bezoeken. Met tien deelnemers hebben we daar 77 soorten gevonden. De aanwezigheid van Kees Uljé stond garant voor het op naam brengen van veel inktzwammetjes, waaronder vijf soorten die nieuw waren voor de Wassenaarse parken. Een zeer zeldzame inktzwam, *Coprinus spelaophilus*, werd uit een holle boom (beuk) geplukt, wat volgens Kees ook de logische vindplaats voor de soort is. Deze staat niet vermeld in het 'Overzicht' en er zijn sinds 1984 geen meldingen bekend. De laatste tien minuten van de excursie leverde, tot grote vreugde van iedereen en vooral van de fotografen onder ons, een groep Kopperode spijkerzwammen (*Chroogomphus rutilus*) onder een den op.

4 september Jeneverbesstruweel aan de A1 bij Rijssen (W. Ligterink)

Het zomerde nog rustig een poosje door, het was droog en warm. In de heide met jeneverbesstruiken was voor mycologen eigenlijk weinig te vinden, tenminste niet de legendarische zeldzaamheden uit de tijd van J.J. Barkman. Alleen een berm en bosrand leverde nog enkele mooie Russula's op en ook Koeienboleten (*Suillus bovinus*) en Roze spijkerzwam (*Gomphidius roseus*). Met vijf deelnemers hebben we 49 soorten gevonden.

11 september Hulshorsterzand (Th. Kuyper)

Het was al dagenlang warm geweest, zeer warm, zelfs voor een regelmatige Afrika-reiziger. Bovendien stond er niet zoveel op de twee plekken waar het kleine clubje doordouwers zich begaf. In dit zeer zandige droge, terrein met dennen stond toch nog de Hanenkam (*Cantharellus cibarius*) en de Appelryssula (*Russula paludosa*). Het werd een kort lijstje maar op een andere plek stond toch nog Tweekleurig elfenbankje (*Gloeoporus dichrous*).

18 september Mantingerzand en Huize Echten (B. de Vries)

Het was wel een hele grote gok; een jeneverbesstruweel bezoeken voor fungi halverwege de maand september. We zaten nog in een serie van meer dan twintig dagen boven de 20°C. De verwachtingen waren minimaal. Toch waren we met ons zessen. 's Morgens hebben we trouw het jeneverbesterrein bezocht. In het struweel stond bijna niets. Een paar korstjes met milieunummer 35 bewijzen dat we er geweest zijn. Aangrenzende bosjes leverden meer op.

's Middags leek het oude bos rond 'Huis te Echten' een goed alternatief. We hebben het he-

le bos afgelopen; de paddestoelendichtheid was dus gering. Dichtbij 'het huis' stond een dikke dode beuk. Aan de voet vonden we een echt reuzengrote Reuzenzwam (*Meripilus giganteus*) van zeker 1 m diameter. Verder rondlopend werd nog wat gewoon goed genoteerd. Bijna op het eind aangekomen vonden we nog een Roodsteelfluweelboleet... dachten we tot een van ons het ding toch maar plukte en tot aller verbazing had het goudgele lamellen. De beschikbare plaatjesboeken en vervolgens alle camera's werden in stelling gebracht. Het was de Goudplaatzwam (*Phylloporus pelletieri*)! Het soortentotaal kwam op 105: 51 voor Mantinge en 78 voor Echten. Een bijzondere dag!

25 september Roggebotsbos en Abbertbos (F.J. Stokman)

De zomer was nog niet echt voorbij en acht deelnemers togen naar het Roggebotsbos en het Abbertbos. Het werd een leuke excursie met behoorlijk wat paddestoelen waaronder diverse leuke soorten. Op de bijschrijf-blaadjes van formulier 1 prijken de namen van de Collybiagalzwam (*Christiansenia mycetophila*), de Gevlekte truffel (*Tuber maculatum*) en Grote aardster (*Geastrum pectinatum*). Er werden drie kilometerhokken 'gedaan', wat een totaal opleverde van 100 soorten.

25 september Kasteel Broekhuizen (G. Immerzeel)

Een excursie naar een landgoed of kasteel heeft altijd iets bijzonders. Kasteel Broekhuizen ligt op de overgang van zand en klei wat veelbelovend is. De totaalijst van deze dag was dus indrukwekkend: 122 soorten waaronder de Oranje berkenboleet (*Leccinum versipelle*), twaalf soorten Russula, de Dunne weerschijnzwam (*Inonotus cuticularis*) en de Roodbruine truffel (*Tuber rufum*). Moeten onze gemeentelijke plantsoenendiensten misschien in de leer bij de kasteel-tuinheren?

9 oktober Slot Haamstede (M.J. Franse)

Bij het slot van Haamstede is een gemengd loofbos op humeuze zandgrond. Het ligt tegen de duinen aan. We waren met slechts vier personen met gelukkig een 'kleine-dingetjesspecialist'. Het was vrij nat, dus goed voor paddestoelen zou je denken. De oogst van de hele dag over twee kilometerhokken was 77 soorten. We vonden o.a. de Donkere bossatijnzwam (*Entoloma myrmecophilum* f. *myrmecophilum*), Witte kluifzwam (*Helvella crispa*), Zalmzwam (*Rhodotus palmatus*) en een zeer dun korstje dat later werd gedetermineerd als *Phlebiella fibrillosa*, een soort die voorkomt op dunne twijgjes en strooisel. De soort is nieuw voor Nederland en is eerder gevonden in Denemarken en Zweden.

9 oktober Amerongse berg (Th. Reijnders)

De Amerongse berg is een geaccidenteerd grindrijk en deels relatief hooggelegen zandheuvel. Het is onderdeel van de Utrechtse heuvelrug. Er staat overwegend loofbos met oude beukenlanen. Pleksgewijs staat aanplant van jong loofhout en naaldhout (spar en lariks).

Een wandeling over deze 'berg' leverde 88 soorten op met als nagedetermineerde bijzonderheden: Behaarde roodsteelcollybia (*Collybia konradiana*) en het Plooiwaaier (*Plicaturopsis crispa*).

16 oktober Voorsterbos (F.J. Stokman)

Het waren ideale weersomstandigheden. Met een rijk bos en twaalf deskundige deelnemers moest dit wel een goede excursie worden. Dat werd dan ook bewaarheid. Het totaal kwam deze dag op 226 soorten met diverse bijzonderheden: veel gordijnzwammen (12 soorten) met o.a. de Lila gordijnzwam (*C. alboviolaceus*) en de Purpersteelgordijnzwam (*C. porphyropus*). Verder tien soorten Russula en drie soorten Tricholoma o.a. de Narcisridderzwam (*T. sulphureum*).

16 oktober Zeist, Noorthout (B. Tolsma)

Dit landgoed, gelegen op zand was nog maar weinig bezocht. Helemaal voedselarm is het terrein toch niet, getuige de vondsten van Gestreept nestzwammetje (*Cyathus striatus*) en Stinkparasolzwam (*Lepiota cristata*), maar de meeste soorten stonden gewoon in arm gemengd bos. Bijzonder was de vondst van de Lila gordijnzwam (*Cortinarius alboviolaceus*), de zoveelste in dit jaar.

23 oktober De Eese (R. Chrispijn)

Omdat het verzamelpunt Steenwijk 10 kilometer van Vledder ligt zagen sommige NMV-leden wellicht tegen het vele fietsen op, want er waren die dag slechts drie deelnemers. Daardoor kon er snel gereageerd worden als iemand wat zag, iets wat met een grotere groep altijd problematischer is. Net buiten Steenwijk moest al op de rem getrapt worden bij een dennenbos dat vol met paddestoelen stond, er zaten alleen geen bijzonderheden tussen. Het aardigste van dat eerste stuk was een greppel met een kleine 200 exemplaren van de Kopperode gordijnzwam (*Cortinarius uliginosus*). Daarna ging het op de Eese aan. Dit gebied, op de stafkaart 'Eeserveld', is een kroonjuweel dat in de laatste jaren een beetje in de versukkeling lijkt te zijn geraakt. Toch zijn er nog groeiplaatsen van Gele stelkelzwam (*Hydnum repandum*), Holsteelboleet (*Boletinus cavipes*) en het tweetal Roze spijkerzwam (*Gomphidius roseus*) met Koeienboleet (*Suillus bovinus*). Hoogtepunt vormde de vondst van de zeer zeldzame Roodbruine melkzwam (*Lactarius hygginus*). Deze was alleen bekend van een vochtigheidsterrein met dennen bij Dwingeloo. Typisch zijn de watervlekken op de roodbruine steel. In de paar uur dat we op de Eese rondliepen en ons brood opaten, zijn er 77 soorten aangetroffen. In totaal vonden we die dag 110 soorten, verspreid over vier verschillende kilometerhokken.

30 oktober Geastmerbosk (S. Greydanus)

Het Geastmerbosk is in de zestiger jaren op landbouwgrond aangeplant als recreatiebos. De vele boomsoorten, es, iep, els, populier, esdoorn, eik, beuk en den, geven het 50 ha grote bos een gevarieerd uiterlijk. Het bos ligt in twee kilometerhokken; in beide werden een vijftigtal soorten genoteerd.

Het eerste deel gaf een vrij droge indruk. Bovendien lag hier een dikke strooisellaag. Er werden dan ook voornamelijk algemene strooisel- en houtsaprotrofen aangetroffen o.a. het Stobbezwammetje (*Pholiota mutabilis*), Elzenbundelzwam (*Pholiota alnicola*) en de zeer fotogenieke Oesterzwam (*Pleurotus ostreatus*).

Het tweede deel was vochtiger. In het gedeelte met berken, wilgen en elzen pronkte massaal de Kopperode gordijnzwam (*Cortinarius uliginosus*). Daar in de buurt werd de Stinksatijnzwam (*Entoloma rhodopolium* f. *nidorosum*) gevonden. Onder de berken stond de Berkenridderzwam (*Tricholoma fulvum*). Het dennenbos leverde geen Oorlepelzwam of Dennenslijmkop op, alleen maar Koningsmantel (*Tricholomopsis rutilans*).

6 november Zwanenwater (M. Noordeloos & A. Gutter)

Op het programma stond Zwanenwater en het weer was zeer nat. Negen personen trotseerden harde wind en regen. Tijdens het zoeken van wat beschutting in een bosje viel een oog op een paddestoeltje, dat later bleek te zijn *Calocera pallidospathulata* oftewel het Spatelhoorntje, een tweede vondst voor Nederland. Meer opvallend in het veld was een forse groep van de Slijmwasplaat (*Hygrocybe laeta*), met honderden op een klein plekje. Dicht daarbij ook nog drie exemplaren van de Verblekende wasplaat (*Hygrocybe luteolaeta*). Op de uitwerpselen van de grote grazers waren verschillende *Psilocybe*'s te zien. Op 1 drol stonden zelfs bijeen de zeldzaamheden Slijmrandkaalkopje en Blauwvoetkaalkopje (resp. *P. liniformans* en *P. fimetaria*). De totale lijst telde zo'n honderd soorten.

Tabel. NMV-excursies 1999.

datum	plaats	excursieleider	aantallen		
			kilometer- hokken	soorten	deelnemers
17 apr	Alphen a/d Rijn	C. Uljé	2	60	7
24 apr	Schoorl De Kerf	M. Groenendaal & PJK	1	10	10
8 mei	Vorden	E. Brouwer	1	73	12
15 mei	A'dam'Waterl.duin	L. Jalink	1	45	34
29 mei	De Appelzak	H. Hendrickx & Geld.	1	8	?
12 jun	Suster.IJzer'bos	P. Kelderman	1	74	10
10 jul	Het Markiezaat	J. Gelderblom	1	26	7
17 jul	Arnhem Warnsborn	E. Jansen	2	80	13
24 jul	Ratum Tenkinkbos	N. Dam	2	86	7
14 aug	A'dam'Waterl.duin	M. Nauta	3	16/29	12
21 aug	Baarnsebos	E. v.d. Dool	4	106	15
28 aug	Ommen en Junne	R. Chrispijn	2	78/77	8
4 sep	Kijfhoek	L. Bakker-Walter	1	77	10
4 sep	Rijssen A1 bocht	W. Ligterink	1	49	5
11 sep	Hulsh.'zand	Th. Kuyper	2	>3	?
18 sep	Mant'zand +Echt.	B. de Vries	2	105	6
25 sep	Roggebotsbos	F.J. Stokman	3	100	8
25 sep	Broekhuizen	G. Immerzeel	1	122	?
09 okt	Slot Haamstede	T. Franse	2	77	4
09 okt	Amerongseberg	Th. Reijnders	1	88	?
16 okt	Voorsterbos	F.J. Stokman	1	226	12
16 okt	Zeist Noorthout	B. Tolsma	1	133	?
23 okt	Eeserveld	R. Chrispijn	4	110	3
30 okt	Geastmerbosk	S. Greydanus	2	52/54	5
6 nov	Zwanenwater	Ch. Noordeloos	2	100	9
27 nov	Schoorlse Duinen	F. v.d. Bergh	4	78	12

27 november Schoorl (F. van den Bergh)

Op 27 november vond de laatste NMV-excursie plaats, in het dennenbos van Schoorl. Twaalf deelnemers konden genieten van een zonnige dag met een heerlijke temperatuur. Hoewel er vier kilometerhokken werden bezocht werd er nauwelijks meer dan 1000 meter gelopen. Tot de meer bijzondere dingen behoorden de Opkrullende strookzwam (*Antrodia ramentacea*), de Duindennenzwam (*Diplomitoporus flavescens*) en de fotogenieke Rode plakkaatzwam (*Meruliopsis taxicola*). Met 78 soorten een waardig besluit.

Afgelast werden: 1 mei Robbenoord (F.v.d. Bergh), 22 mei Vlissingen (M.J. Franse), 5 juni Helmond Warande (L. Raaymakers), 19 juni Gelderse Vallei (J. Wisman), 26 juni Roden Kleibos (J. Schreurs), 3 juli De Berendonk (N. Dam), 31 juli Lochem Wildenborch (J. Dieker), 7 augustus Susteren IJzerenbos (P. Kelderman), 18 september Eyserbosch (P. Kelderman), 20 november Oss Slabroek (N. Dam).