

geen halve km afstand nog eens een paar honderd exemplaren *Pseudocraterellus undulatus*, tegenwoordig *P. sinuosus* (Kleine trompetzwam) stonden. De klap op de vuurpijl stond echter in Coolia 44(1):16 de vondst van *Pulveroboletus lignicola* (Houtboleet) gedaan door Wouter Teunissen.

"Opsporing verzocht" leidde in dit geval tot een juweel van een terrein.

Literatuur

- Arnolds, E.J.M., Kuyper, Th. W., Noordeloos, M.E. 1995. Overzicht van de paddestoelen in Nederland, Uitgave Nederlands Mycologische Vereniging, Wijster.
- Arnolds, E. & Veerkamp, M. 2000. Opsporing verzocht! De integrale aandachtssorten in het paddestoelenmeetnet. Coolia 43(2): 58-74.
- Chrispijn, R. et al. 2000. Kaartenbijlage Overzicht van de Paddestoelen in Nederland. NMV., Baarn.
- Maas Geesteranus, R.A. 1975. Die terrestrischen Stachelpilze Europas. Verh. Kon. Akad. Wetensch.
- Noordeloos, M.E. 2001. Hoe raak ik thuis in de boleten-4. Coolia 44(1): 12-18.

Atte van den Berg, Wittemerslag 17, 8131 WH Wijhe

Een zware aantasting door de Echte tonderzwam

Tjallingii, F. 2001. A severe attack by *Fomes fomentarius*. Coolia 44(3): 193.

Een artikel met foto van Aad Termorshuizen over een massaal optreden van deze zwam bij Doorwerth is verschenen in Coolia 43(4), blz. 223. Als bewoner van Huize Mooiland bij Doorwerth was mij deze vindplaats uiteraard ook bekend en tracht ik zo lang mogelijk bij te houden wat daar gebeurt. Een paar opmerkingen mogen het stukje van Termorshuizen aanvullen.

Als vindplaats wordt vermeld het 'Bilderberghotel'. Maar in werkelijkheid is het het Hotel Wolfheze, dat recentelijk met enkele naburige onder de gemeenschappelijke naam Bilderberg is samengevoegd. Het echte oude Bilderberghotel ligt echter iets verderop, richting Arnhem.

Zoals op de foto van Aad ook is te zien zitten de vruchtlichamen op het liggende bovenste deel van de doorgebroken stam horizontaal en zijn ze dus de laatste drie jaar gevormd. Bij nader onderzoek waren er op dit stuk ook nog sterk vergane resten van verticale hoeden aanwezig, die dus ouder zijn dan drie jaar. Een interessante vraag is nu: hoe lang gaat de hoedvorming op beide stamstukken nog door? In de buurt wonende mycologen zullen dit graag willen bijhouden. Maar dan doet zich de vraag voor: wat moeten we verstaan onder een 'exemplaar'? Veel vruchtlichamen zijn samengesteld uit grote(re) en klein(er)e hoeden. Is elk hoedrandje nu een 'exemplaar'? Blijven alle vroeger gevormde hoeden bestaan en vormen ze (soms) nieuwe hoedranden beneden de oude? Bij een telling geeft dit (onoverkomelijke?) moeilijkheden.

Frans Tjallingii, Huize Mooiland, Kamer 154, Utrechtseweg 425, 6865 CK Doorwerth