

Dank

De heer H. Jansen (Almelo) heeft de beide in de literatuurlijst genoemde artikelen gestuurd en toestemming gegeven ze in Coolia te bespreken, waarvoor vriendelijk dank.

Literatuur

- Jansen, H. en Gregor, H.J. 1999. Eerste vondst van een laat-tertiaire boomzwam (*Trametes* sp.) met begeleidende flora en fauna uit de omgeving van Almelo. Grondboor & Hamer (1): 4-10.
- Jansen, H. en Gregor, H.J. 1996. Neufund eines jungtertiären Baumschwammes aus der Umgebung von Almelo (Niederlande). Documenta naturæ 107:1-12. München.
- Meschinelli, A. 1902. Fungorum fossilium omnium hucusque cognitorum – iconographia. Vicetiae (Vicenza).

Camarops lutea, nieuw voor Nederland

Rectificatie op: Mycologisch avontuur in ‘De Kaaistoep’ (1), Coolia 46(4): 175-176

L. Rommelaars¹ & A. Aptroot²

¹ Beilerstroom 14, 5032 ER Tilburg; E-mail: l.rommelaars@home.nl

² G. v.d. Veenstraat 107, 3762 XK Soest

In Coolia 46(4): 175-176 (2003) werd materiaal gerapporteerd en geïllustreerd van een *Camarops*. Al vrij spoedig kwam er een reactie van onze Vlaamse collega R. Walley. Hij vermoedde dat op grond van de foto's en de opgegeven sporenmaten het beschreven materiaal wel eens de nauw verwante *Camarops lutea* zou kunnen zijn. Deze soort wordt onder andere gekenmerkt door een gele verkleuring van het hout onder de stromata. Deze reactie heeft ons aan het denken gezet. Bij de Nederlandse collectie uit ‘De Kaaistoep’ ontbrak de geelverkleuring. Ook jonge lichtgele stromata ontbraken. Ter vergelijking met onze collectie werd herbariummateriaal uit België toegezonden. Ongeveer gelijktijdig werd in ‘De Nieuwe Tiend’ bij Udenhout nieuw materiaal gevonden. De drie collecties bleken microscopisch identiek. Bij de collectie uit Udenhout was de gele verkleuring van het substraat zeer duidelijk te zien. De sporenmaten waren nu $6-7 \times 3-4 \mu\text{m}$ en geven nauwelijks overlap met de sporenafmetingen van *Camarops microspora* nl. $4,5-5,5 \times 2-2,5 \mu\text{m}$.

Het is duidelijk dat beide Nederlandse collecties gerekend moeten worden tot *Camarops lutea* (Alb. & Schweiz. : Fr.) Shear, die nog niet eerder uit Nederland was opgegeven, maar wel bekend is van onder andere aangrenzend België (materiaal gezien van Kwaremont (E2.47.44), leg. Walley no. 3295, 28 okt. 2003 (dupl. in herbarium CBS)), Duitsland, Engeland en Scandinavië. Er zijn nu dus twee collecties uit Nederland: Udenhout, Nieuwe Tiend (137/403), leg. Rommelaars, 15 nov. 2003 (herbarium CBS en herbarium C8); Tilburg, De Kaaistoep (129-394), leg. Rommelaars, 22 maart 2003 (herbarium CBS en herbarium C8).