

Literatuur

- Arnolds, E.J.M. 1983. Ecology and coenology of macrofungi of grasslands and moist heathlands in Drenthe, the Netherlands, vol. 2. Bibliotheca mycologica 90. Vaduz.
- Bon, M. 1987. Novitates. Documents Mycologiques 17(67): 11-13.
- Fries, E. 1861. Hymenomycetes novi vel minus cogniti, in Suecia 1852-1860 observati. Öfversigt Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 18: 23.
- Holec, J. 2001. The genus *Pholiota* in central and western Europe. Libri botanici 20. IHW Verlag.
- Jacobsson, S. 1989. Studies on *Pholiota* in culture. Mycotaxon 36: 95-145.
- Jacobsson, S. 1991. *Pholiota* in Northern Europe. Windahlia 19: 1-86.
- Jacobsson, S. 1997. New observations on *Pholiota*. Windahlia 22: 23-28.
- Kühner, R. 1980. Les Hyménomycètes Agaricoïdes. Bull. Soc. Linn. Lyon 49 (no. spéc.).
- Lange, J. 1940. Flora agaricina danica, vol. 5. Copenhagen.
- Moncalvo, J.M. & al. 2002. One hundred and seventeen clades of euagarics. Molecular Phylogenetics and Evolution 23: 357-400.
- Noordeloos, M.E. 1998. *Pholiota*, *Psilocybe*, and *Panaeolus*. Fungi non delineati, vol. IV. Mykoflora, Alassio.
- Noordeloos, M.E. 1999. *Pholiota*. In Bas, C., Kuyper, Th.W., Noordeloos, M.E. & Vellinga, E.C. (red.). Flora agaricina neerlandica, vol. 4. Balkema, Rotterdam.
- Reijnders, A.F.M. 1998. *Pholiota gymnopodia*, comb. nov. Persoonia 17: 113-118.
- Tjallingii-Beukers, G. 1987. Het geslacht *Pholiota*. K.N.N.V. Wetenschappelijke Mededelingen 185.
- Watling, R. & Gregory, N. 1987. Strophariaceae & Coprinaceae p.p. Brit. Fungus Flora vol. 5.

VERSLAG 7-9 NOVEMBER 2004: VERENIGINGSWEEKEND IN BAKKUM

Marcel Groenendaal

De Ruyterstraat 91, 1792 AM Oudeschild

Groenendaal, M. 2004. Report on the Dutch mycological Society's weekend in Bakkum, 7-9 November. Coolia 47(2): 105-106.

A report is given on the Dutch mycological Society's weekend in 2003, in Bakkum, 7-9 November. Notable finds are e.g. *Hygrophorus mesotephurus* and *Clitocybe alexandri*, species which were thought to be extinct.

Vooraf in het begin van het weekend heerste er een stevige gure oostenwind, in schril contrast met het aangenaam verwarmde en gezellige verblijf bij de 'Stayokay' herberg. Hier was het 's avonds goed toeven (en eten) voor de 14 deelnemers plus enige tijdelijke gasten. Met behulp van wat verlengsnoeren werden er een paar microscopen in werking gezet, maar de meeste mensen bewaarden toch materiaal voor thuis.

Bos en duinen waren vrij arm aan paddestoelen, in elk geval qua aantal vruchtlichamen. Niet alleen de wind, maar ook de vorst een paar weken ervoor en niet te vergeten het hele droge voorafgaande jaar waren daar waarschijnlijk wel debet aan. Hoewel van één excursie de resultaten slechts ten dele bekend zijn kan voorlopig wel de balans worden opgemaakt. Het totale aantal soorten ligt (met die ene excursie erbij geschat) op ongeveer 250. In de

afgelopen 10 Coolia-jaren heb ik driemaal een weekendverslag gevonden met een genoemd soortenaantal, en dat was dan 300 of meer, maar mogelijk waren dit juist de beste jaren? Wie nu denkt: goed dat ik deze keer niet geweest ben, heeft misschien toch ongelijk want er kwamen toch zeker wel allerlei bijzondere dingen te voorschijn.

Al op vrijdag werd er eigenlijk dicht bij onze verblijfplaats een Tengeres slijmkop (*Hygrophorus mesotephrus*) gevonden, een soort die op de Rode Lijst staat als VN, Verdwenen. De enige eerdere vondst in ons land was volgens de Atlas (Nauta en Vellinga, 1995) in 1957 op de Wolperhorst in Zeist. Opmerkelijk genoeg zou deze soort tijdens de excursie naar Leyduin, dat was een week na dit weekend en 25 kilometer zuidelijker, eveneens worden gevonden. Andere leuke soorten bij Bakkum waren bijvoorbeeld de Pelargoniummelkzwam (*Lactarius decipiens*) en de Smalplaatrussula (*Russula chloroides*).

Op de ene zaterdagexcursie werd op zijn minst een Forse aardster (*Geastrum coronatum*) gevonden, en de Purperbruine mycena (*Mycena purpureofusca*). De andere ging via Kijkuit naar de Papenberg. Opvallend vaak stond hier in de omgeving langs bospaden het Heksenschermpje (*Mycena rosea*). Op de berg zelf stonden Kabouterwasplaten (*Hygrocybe insipida*), en er dichtbij een Oranjebruine kleefparasol (*Limacella glioderma*), in de wind zo uitgedroogd dat hij in het veld werd versleten voor een Gladde wolsteelparasolzwam (*Lepiota oreadiformis*). Een enorme vondst was een Dikke trechterzwam (*Clitocybe alexandri*) die daar in zijn eentje langs een bospad zwaar zeldzaam stond te wezen (VN). Wat bescheidener van omvang maar eveneens zeldzaam was een Wortelende champignonparasol (*Leucoagaricus pinguipes*). Alweer een soort die in de Rode Lijst staat als waarschijnlijk uitgestorven (VN), maar de laatste paar jaren zijn er in het Noord-Hollandse duingebied toch weer verscheidene waarnemingen van gedaan. Andere leuke soorten waren verder de Geurige russula (*Russula odorata*) en de Purperrode franjehoed (*Psathyrella bipellis*).

Een zondagexcursie ging naar de Zuidhoek. Op een mossig plekje stonden zowel Peperbussen (*Myriostoma coliforme*) en Ruwe aardster (*Geastrum campestre*) als Ruwstelige stuifbal (*Tulostoma fimbriatum*) en Donkerstelige stuifbal (*T. melanocyclum*). Bij Helm werd de Duinvaalhoed gezien (*Hebeloma psammophilum*) en middenin een dichte helmpol eenmaal een groep Knophaarschelpjes (*Cellypha goldbachii*). Een ander resultaat van dichte vegetatie uitpluizen was een stel Roze peutermycena's (*Mycena smithiana*).

De andere zondagexcursie richting Kruisberg zag o.a. Bundelinktzwam (*Coprinus hiascens*), Witte ridderzwam (*Tricholoma album*) en ook weer Ruwstelige stuifbal. De Gesteelde stuifbal (*Tulostoma brumale*) werd dit weekend overigens op ongeveer elke excursie waargenomen.

Al met al was er dus best veel te beleven en was het een prima weekend.